

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ТРАУМЕЛЬ С**  
**(TRAUMEEL® S)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 100 г препарату містять: *Achillea millefolium* Ø – 0,09 г, *Aconitum napellus* D1 – 0,05 г, *Arnica montana* D3 – 1,5 г, *Atropa bella-donna* D1 – 0,05 г, *Bellis perennis* Ø – 0,1 г, *Calendula officinalis* Ø – 0,45 г, *Echinacea* Ø – 0,15 г, *Echinacea purpurea* Ø – 0,15 г, *Hamamelis virginiana* Ø – 0,45 г, *Hepar sulfuris* D6 – 0,025 г, *Hypericum perforatum* D6 – 0,09 г, *Matricaria recutita* Ø – 0,15 г, *Mercurius solubilis Hahnemanni* D6 – 0,04 г, *Symphytum officinale* D4 – 0,1 г;

*допоміжні речовини:* спирт цетостеариловий (тип А) емульгований, парафін в'язкий, парафін білий м'який, вода очищена, етанол 96 %.

**Лікарська форма.** Мазь.

М'яка мазь від білого до червоно-білого кольору з незгірклим запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат має протизапальну, анальгетичну, протиексадативну, імунокоригуючу, репаративну дію, яка базується на активації захисних сил організму та нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного та мінерального походження, які входять до складу препарату.

**Показання для застосування.**

Спортивні та побутові травми (розтягнення, вивих, гематома, гемартроз, перелом), родові травми. Запальні, мікротравматичні та дегенеративні процеси опорно-рухового апарату (тендовагініт, плечолопатковий періартрит, бурсит, артрит тазостегнового, колінного суглобів і суглобів стопи та кисті). Запальні процеси шкіри, зубощелепного апарату (періодонтит, гнійний пародонтит, гінгівіт, прорізування зубів). Пролежні, опіки, пітниця, трофічні виразки.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до одного з активних компонентів або допоміжних речовин, до арніки, ромашки, *Achillea millefolium* чи до інших рослин родини айстрових (складноцвітих).

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Не наносити мазь на ділянки великої площі.

При утримуванні симптомів чи погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Через відсутність достатнього задокументованого досвіду препарат можна застосовувати у період вагітності та годування груддю тільки після консультації з лікарем.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Невідома.

*Діти.* Препарат рекомендований для застосування дітям від народження за призначенням лікаря.

**Спосіб застосування та дози.**

Дорослим та дітям від народження мазь накладати тонким шаром на місце травми чи запалення 2-3 рази на добу. При гострих травмах – до 5-6 разів на добу. Мазь можна втирати легкими рухами чи накладати під пов'язку. Можна вводити з фонофорезом.

Курс лікування – 2-4 тижні.

**Передозування.**

Не відзначалося.

**Побічні ефекти.**

У дуже поодиноких випадках можуть спостерігатися реакції гіперчутливості або місцеві алергічні реакції (шкірні висипання, кропив'янка, запалення шкіри, почервоніння, опухлість та свербіж), у випадку яких застосування препарату необхідно припинити. Цетилстеариловий спирт може спричинити місцеві шкірні реакції (контактний дерматит).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Невідома. За призначенням лікаря препарат можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування.

**Термін придатності.** 3 роки.**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

Туба на 50 г у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.