

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**ДЕНТИНОКС - ГЕЛЬ Н**  
**(DENTINOX - GEL N)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 1 г гелю містить настоянку ромашки (Tinctura Matricariae) (1:5) (екстрагент – етанол 70%) - 150 мг, лідокаїну гідрохлориду 3,4 мг, полідоканолу 600 (макроголу лаурилефір) 3,2 мг;  
*допоміжні речовини:* пропіленгліколь, ксиліт, сорбіту розчин 70 % (E 420), натрію едетат, карбомер (974P), натрію гідроксид, полісорбат 20, сахарин натрію, вода очищена.

**Лікарська форма.** Гель для ясен.

Гель жовтого кольору, з характерним запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.** «Дентінокс Гесельшафт фармасьютіше препарати Ленк та Шуппан», Німеччина.

Нунсдорфер Рінг 19, 12277 Берлін, Німеччина.

«Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate Lenk & Schuppan», Germany.

Nunsdorfer Ring 19, 12277 Berlin, Germany.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби для застосування у стоматології. Код АТС А01АD11.

Застосування рослинного протизапального компонента настою ромашки та місцевих анестетиків, лідокаїну і полідоканолу 600 (макрогол лаурилефір), в низькій спеціально підібраній для дітей дозі перешкоджає виникненню болю при прорізуванні молочних зубів.

Настойка ромашки: протизапальний рослинний компонент.

Лідокаїну гідрохлорид: місцевий знеболювальний, безпечний компонент у діючій, однак безпечній дозі (0,34 %).

Полідоканол 600 (макроголу лаурилефір): місцевий знеболювальний, безпечний компонент, що добре утримується на слизовій оболонці ротової порожнини і чинить тривалу терапевтичну дію.

Препарат не спричиняє карієсу зубів.

**Показання для застосування.** Для полегшення прорізування молочних зубів (подрознення ясен, запалення і болю).

**Протипоказання.** Випадки відомої підвищеної чутливості до ромашки або інших складноцвітих, лідокаїну або аналогічних місцевих анестетиків (амідного типу), підвищена чутливість до одного з будь-яких інших компонентів препарату.

Ушкодження слизової оболонки порожнини рота.

З огляду на вміст сорбіту препарат не рекомендують застосовувати для лікування пацієнтів із вродженою підвищеною чутливістю до фруктози.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.** Уникати попадання в очі. Високі дози не слід застосовувати довше зазначеного періоду без консультації з лікарем. Слід уникати потрапляння препарату на відкриті рани. Руки слід ретельно вимити після нанесення гелю. Препарат може викликати оніміння язика, тому після застосування гелю слід з обережністю вживати їжу і напої.

У разі виникнення сильного почервоніння або набряку ясен чи серйозних супутніх скарг слід проконсультуватися з лікарем.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або*

*годування груддю.* Препарат застосовують тільки дітям. Досліджень щодо застосування у період вагітності або годування груддю не проводилося.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Препарат застосовують тільки дітям. Вплив на психомоторні реакції не досліджувався.

**Діти.** Препарат застосовують тільки дітям.

**Спосіб застосування та дози.** При перших ознаках прорізування зубів пальцем або паличкою з ватою нанести на ясна в місці прорізування зуба краплю гелю розміром з горошину і легко втерти. Аплікації проводити 2-3 рази на добу, особливо після їди та перед сном.

Дентінокс-гель Н можна застосовувати до появи усіх молочних зубів, а також по мірі прорізування корінних.

**Передозування.** При дотриманні рекомендацій щодо застосування передозування не спостерігалось. Випадків інтоксикації не зафіксовано.

**Побічні ефекти.** Тимчасове легке печіння, подразнення, почервоніння. Можливе виникнення алергічних реакцій, включаючи контактні алергічні реакції, шкірні висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідомі. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

**Термін придатності.**

5 років. Після першого відкриття туби препарат придатний до застосування протягом 1 року.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії світла.

**Упаковка.**

По 10 г в алюмінієвій тубі; по 1 тубі у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.