

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**ЕУФОРБИУМ КОМПЗИТУМ НАЗЕНТРОПФЕН С**  
**(EUPHORBIUM COMPOSITUM NASENTROPFEN S)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 100 г препарату містять: Argentum nitricum D10 – 1 г, Hepar sulfuris D10 – 1 г, Hydrargyrum biiodatum D8 – 1 г, Mucosa nasalis suis D8 – 1 г, Sinusitis-Nosode D13 – 1 г, Euphorbium D4 – 1 г, Luffa operculata D2 – 1 г, Pulsatilla pratensis D2 – 1 г;

*допоміжні речовини:* бензалконію хлориду розчин, натрію гідрофосфат дигідрат, натрію хлорид, натрію дигідрофосфат дигідрат, вода очищена.

**Лікарська форма.** Спрей назальний.

Від прозорого до злегка опалесцентного, від безбарвного до злегка світло-жовтого кольору розчин, запах нейтральний.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат чинить протинабрякову, протизапальну, протівірусну, імунокоригуючу та протиалергічну дію, що базуються на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

**Показання для застосування.**

Риніти різної етіології (вірусні, бактеріальні, алергічні) та видів (вазомоторні, сухі, гіперпластичні та атрофічні). Гострий та хронічний синусит. Озена (як додатковий засіб).

**Протипоказання.**

Гіперчутливість до бензалконію хлориду та до інших компонентів препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

У перші кілька днів застосування препарату інколи можливе короткочасне збільшення секретії з носа, що є доброю ознакою і не потребує припинення лікування.

При утримуванні симптомів чи погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.

**Особливі застереження.**

***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Через недостатність належного задокументованого досвіду питання щодо доцільності застосування препарату у період вагітності або годування груддю вирішує лікар індивідуально з урахуванням співвідношення користь-ризик.

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*** Невідома.

***Діти.***

Препарат рекомендований для застосування дітям від 2 років (за призначенням лікаря).

**Спосіб застосування та дози.**

Разова доза: дорослим і дітям від 6 років – по 1-2 упорскування у кожен ніздрю 3-5 разів на добу; дітям від 2 років до 6 років – по 1 упорскуванню 3-4 рази на добу.

Курс лікування: 2-6 тижнів.

**Передозування.** Не відзначалося.

**Побічні ефекти.**

Можливий розвиток алергічних реакцій у випадку підвищеної чутливості до компонентів препарату.

У дуже поодиноких випадках після застосування препарату може спостерігатися подразнення слизової оболонки носа з відчуттям печіння та гіперсекрецією. У таких випадках застосування лікарського засобу слід припинити.

У дуже поодиноких випадках у пацієнтів зі схильністю до бронхіальної астми прийом препарату може спричинити бронхоспазм через наявність у складі препарату бензалконію хлориду.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Сумісний з іншими лікарськими засобами.

**Термін придатності.** 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

Розпилювач на 20 мл у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.