

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АППРОСТ

Склад лікарського засобу:

1 капсула містить фенольного гідрофобного препарату прополісу у перерахуванні на 100 % вміст суми фенольних сполук 60 мг, пилок квіткового 100 мг;

допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний, целюлоза мікрокристалічна.

Лікарська форма. Капсули.

Тверді желатинові капсули з жовтим непрозорим корпусом і зеленою непрозорою кришкою. Вміст капсули – суміш порошку жовто-коричневого кольору зі специфічним запахом з темними і світлими включеннями. Допускається наявність агломератів часток.

Назва і місцезнаходження виробника. ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються в урології. Інші препарати, включаючи комбінації. Код АТС G04B X.

Комплексний препарат на основі продуктів бджільництва, що містить фенольний гідрофобний препарат прополісу (ФГПП) і пилок квітковий. До складу ФГПП входять флавоноїди (апигенін, лютеолін, робіданол), флавоноли (кверцетин, кемпферол), оксикумарини, фенолокарбонові кислоти. Пилок квітковий містить білки і вільні амінокислоти, нуклеїнові кислоти, ліпідні компоненти (тригліцериди, фосфоліпіди, ненасичені жирні кислоти), фітостерини, вітаміни (β-каротин, Е, С, В₁, В₂, РР), макро- і мікроелементи (калій, кальцій, магній, залізо, цинк, мідь, кобальт, фосфор, марганець, сірка, срібло, нікель, натрій, хлор), фенольні сполуки (катехіни, флавоноїди, антоціани, лейкоантоціани, аурони, халкони і фенолокислоти), фітогормони (брасини), вуглеводи (переважно фруктоза і глюкоза), ферменти. Склад препарату обумовлює широкий спектр його фармакологічних властивостей: протизапальну, антиоксидантну, мембранопротекторну, знеболювальну, репаративну активність і коригувальний вплив на рівень андрогенів. Фармакологічні ефекти ФГПП і пилок квіткового забезпечують вплив на основні ланки патогенезу простатиту: сприяють регенерації клітин передміхурової залози, послаблюють больові відчуття та усувають запалення. Препарат не чинить токсичної дії на сперматогенез. Не впливає на клітинну і гуморальну ланки імунітету, не виявляє місцевопідразнювальної, мутагенної, кумулятивної, ульцерогенної дії. Препарат не впливає на секреторну активність залоз шлунка і не чинить токсичної дії на функції життєво важливих органів і систем організму при тривалому застосуванні.

Показання для застосування. У складі комплексної терапії гострого і хронічного бактеріального простатиту, хронічного небактеріального простатиту/синдрому хронічного тазового болю (запального і незапального), безсимптомного запального простатиту. Профілактика гострого і рецидивів хронічного простатиту.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату/продуктів бджільництва.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Перед початком лікування препаратом необхідна консультація лікаря для виключення наявності злоякісного новоутворення у простаті.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовувати жінкам.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не застосовувати дітям.

Спосіб застосування і дози. Препарат приймати за 30 хвилин до їди.

При гострому бактеріальному простатиті приймати по 2 капсули 3 рази на добу протягом 1 місяця. У разі необхідності курс лікування можна продовжити.

При хронічному бактеріальному простатиті, хронічному небактеріальному простатиті/синдромі хронічного тазового болю (запального і незапального), безсимптомному запальному простатиті приймати по 2 капсули 3 рази на добу протягом 2 місяців. У разі необхідності через 2 тижні перерви курс лікування можна повторити.

Для профілактики рецидивів гострого і хронічного простатиту приймати по 1 капсулі 3 рази на добу протягом 3–4 тижнів 3–4 рази на рік.

Передозування. Значне збільшення дози при тривалому застосуванні може спричинити алергічну реакцію і нудоту.

Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти. Можливі нудота, алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. У разі необхідності сумісного застосування препарату з іншими лікарськими засобами (до складу яких входять важкі метали, наприклад антацидні засоби), спроможні утворювати з ним комплекси, приймати препарати треба з інтервалом не менше 30 хвилин для запобігання взаємодії.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. Капсули № 10х3, № 10х6 у блістерах у коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.