

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ОБЛІПХОВА ОЛІЯ

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: олія обліпихова;

1 супозиторій містить олії обліпихової з вмістом суми каротиноїдів у перерахунку на бета-каротин 240 мг% - 0,5 г;

допоміжні речовини: бутилгідроксіанізол (Е 320), бутилгідрокситолуол (Е 321), твердий жир, гліцерин.

Лікарська форма. Супозиторії ректальні.

Супозиторії від оранжевого до темно-оранжевого кольору торпедоподібної форми.

Назва і місцезнаходження виробника. ВАТ "НИЖФАРМ". Російська Федерація, 603950, Нижній Новгород, ГСП-459, вул. Салганська, 7.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Код АТС А16А Х.

Обліпихова олія стимулює репаративні процеси у шкірі та слизових оболонках, прискорює загоювання ушкоджених тканин. Має антиоксидантні та цитопротекторні властивості. Зменшує інтенсивність вільнорадикальних процесів та захищає від ушкодження клітинні та субклітинні мембрани (через наявність жиророзчинних біоантиоксидантів).

Показання для застосування. Геморой, тріщини ануса, виразки прямої кишки, ерозивно-виразковий сфінктерит та проктит, катаральний та атрофічний проктит, променеве ураження слизової оболонки нижніх відділів товстої кишки.

Протипоказання. Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату; діарея захворювання підшлункової залози, жовчокам'яна хвороба.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю . Застосування у період вагітності або годування груддю можливе, якщо, на думку лікаря, очікуваний позитивний ефект для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Застосовують дітям віком від 6 років.

Спосіб застосування та дози. Застосовують ректально після випорожнення кишечника, супозиторій вводять глибоко у задній прохід.

Дорослим та дітям віком від 14 років призначають по 1 супозиторію 2 рази на добу.

Дітям віком від 6 до 14 років призначають по 1 супозиторію 1 раз на добу.

Тривалість лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання. В середньому курс лікування становить 10-14 днів. При потребі за призначенням лікаря через 4-6 тижнів курс лікування повторюють.

Передозування. Випадки передозування не описані.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, відчуття печіння у ділянці заднього проходу.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Взаємодія з іншими лікарськими засобами на даний час невідома.

Термін придатності. 1 рік 6 місяців.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці при температурі від 5 до 15 °С.

Упаковка. По 5 супозиторіїв у блістері. По 2 блістери у картонній пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.