

# ІНСТРУКЦІЯ

## для медичного застосування препарату

### ЕХІНАЦЕЯ КОМПОЗИТУМ С (ECHINACEA COMPOSITUM S)

#### **Склад:**

*діючі речовини:* 2,2 мл розчину містять: Acidum arsenicosum D8 – 22 мг, Aconitum napellus D3 – 22 мг, Argentum nitricum D8 – 22 мг, Arnica montana D4 – 22 мг, Baptisia tinctoria D4 – 22 мг, Bryonia D6 – 22 мг, Cortisonum aceticum D13 – 22 мг, Echinacea D3 – 22 мг, Eupatorium perfoliatum D6 – 22 мг, Euphorbium D6 – 22 мг, Gelsemium sempervirens D6 – 22 мг, Grippeimpfstoff Nosode D13 – 22 мг, Hepar sulfuris D10 – 22 мг, Hydrargyrum bichloratum D8 – 22 мг, Lachesis D10 – 22 мг, Phosphorus D8 – 22 мг, Phytolacca americana D6 – 22 мг, Pulsatilla pratensis D8 – 22 мг, Pyrogenium Nosode D198 – 22 мг, Rhus toxicodendron D4 – 22 мг, Sanguinaria canadensis D4 – 22 мг, Staphylococcus Nosode D18 – 22 мг, Streptococcus haemolyticus Nosode D18 – 22 мг, Sulfur D8 – 22 мг, Thuja occidentalis D8 – 22 мг, Zincum metallicum D10 – 22 мг;

*допоміжні речовини:* натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

**Лікарська форма.** Розчин для ін'єкцій.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Комплексне лікування гострих та хронічних запальних та гнійно-інфекційних захворювань слизових оболонок, внутрішніх органів і шкіри, що перебігають з вираженою інтоксикацією та частими рецидивами.

##### **Противоказання.**

Підвищена чутливість до рослин родини складноцвітих (у т.ч. *Arnica*, *Echinacea*), родини плюща отруйного або до інших компонентів препарату.

Туберкульоз, лейкемія, запальні захворювання сполучних тканин (колагенози), аутоімунні захворювання, розсіяний склероз, захворювання системи крові, СНІД, ВІЛ-інфекції, імуносупресія або імунодефіцит різної етіології та інші хронічні вірусні захворювання.

##### **Спосіб застосування та дози.**

Разова доза, яка водночас є добовою: дорослим і дітям від 12 років – 2,2 мл; дітям від 1 до 3 років – 0,6 мл, від 3 до 6 років – 1,0 мл, від 6 до 12 років – 1,5 мл. Застосовувати 1-3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних, а за необхідності – внутрішньовенних (струминно) ін'єкцій, а також в акупунктурні точки.

Курс лікування – 2-6 тижнів.

##### **Побічні реакції.**

У дуже поодиноких випадках можуть виникати шлунково-кишкові розлади або шкірні реакції, у тому числі через кілька днів після застосування препарату.

Під час лікування препаратами, що містять Сангвінарію канадську, спостерігалися поодинокі випадки підвищення рівня трансаміназ і білірубину в сироватці крові аж до появи медикаментозної жовтяниці (медикаментозний токсичний гепатит), які зменшувалися або нормалізувалися після припинення прийому препарату.

У дуже поодиноких випадках у осіб з підвищеною чутливістю до рослин родини складноцвітих (у т.ч. *Arnica*, *Echinacea*) можуть виникати реакції гіперчутливості (до анафілактичної реакції). Тимчасово можуть виникати реакції у місці ін'єкції, у тому числі почервоніння, набрякання та біль.

Після застосування препаратів, що містять екстракти ехінацеї, спостерігалися реакції з боку травного тракту (у т.ч. нудота, біль у животі); менструальні розлади; акне, шкірні висипи,

свербіж, кропив'янка; збудження, порушення сну; у поодиноких випадках – набряк обличчя, утруднене дихання (задишка), запаморочення та зниження артеріального тиску.

***Передозування.***

Не відзначалося. Можливе посилення побічних реакцій.

***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Препарат не застосовують у період вагітності або годування груддю у зв'язку з наявністю у складі Сангвінарії канадської (*Sanguinaria canadensis*).

***Діти.***

Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 1 року.

***Особливості застосування.***

При утримуванні симптомів чи погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем. При захворюваннях печінки або при одночасному прийомі гепатотоксичних лікарських засобів, препарат застосовувати тільки після консультації з лікарем. При застосуванні препарату більше 4 тижнів необхідно контролювати показники функцій печінки.

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.***

Невідома.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Невідома. За призначенням лікаря препарат можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування.

Якщо застосовують лікарські засоби з вираженою гепатотоксичною дією, питання про одночасний прийом з препаратом ЕХІНАЦЕЯ КОМПОЗИТУМ С вирішує лікар індивідуально.

***Фармакологічні властивості.***

*Фармакодинаміка.* Препарат імуномодуючої, протизапальної та дезінтоксикаційної дії, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

***Фармацевтичні характеристики.***

***Основні фізико-хімічні властивості:*** прозорий безбарвний розчин без запаху і практично вільний від часток.

***Несумісність.***

Невідома.

***Термін придатності.*** 5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

***Упаковка.***

5 ампул та 100 (5x20) ампул по 2,2 мл у картонній коробці.

***Категорія відпуску.*** За рецептом.

***Виробник.***

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/  
Biologische Heilmittel Heel GmbH.

**Місцезнаходження.**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/  
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.