

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЗІРКА

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г бальзаму містить ментолу 41 мг, камфори 258 мг, олії м'яти перцевої (olei Menthae piperitae) 125 мг, олії евкаліптової (olei Eucalypti) 88 мг, олії гвоздичної (olei Caryophylli) 9 мг, олії коричної (olei Cinnamomi) 14 мг;
допоміжні речовини: віск бджолиний, парафін, ланолін, парафін білий м'який, метиловий оранжевий.

Лікарська форма. Бальзам.

Мазеподібна маса коричнево-жовтого кольору з запахом ефірних олій.

Назва і місцезнаходження виробника.

Данафа Фармасьютикал Джоінт Сток Компані, В'єтнам.
вул. Зунг Сі Тхань Тхе, б.253, м. Дананг, В'єтнам.

Фармакотерапевтична група.

Протисвербіжні засоби. Код АТС D04A X.

Препарат належить до групи засобів, що стимулюють рецептори слизових оболонок, шкіри та підшкірних тканин. Бальзам має протизапальні, місцевозгріваючі, антисептичні, анестезуючі властивості, також розширює капіляри, покращуючи кровопостачання та незначною мірою знижує артеріальний тиск, діє на рефлекторні центри центральної нервової системи, проявляючи стимулюючий ефект. Для бальзаму Зірка проявляється послабленням запального процесу та рефлекторним усуненням відчуття болю (головного, м'язового), спричиненого грипом, застудними захворюваннями, хворобами органів опорно-рухового апарату, ураженнями шкіри та іншими чинниками.

Показання для застосування.

Симптоматичне лікування запаморочення, головного болю, застуди, нежитю, нудоти; при укусах комах.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату. Бронхіальна астма, коклюш, псевдокруп, схильність до судом. Пошкодження шкіри, у тому числі при опіках, порушенні цілісності шкіри, екземи, дерматиті, гнійничкових захворюваннях шкіри.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Тільки для зовнішнього застосування. Уникати контакту бальзаму з очима, слизовими оболонками та відкритими ранами. Не втирати у ніздрі. У поодиноких випадках можливі алергічні реакції. У разі появи таких реакцій слід припинити застосування препарату і змити його залишки з місць нанесення теплою водою з милом.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Через відсутність досвіду застосування бальзаму Зірка у період вагітності або годування груддю призначати препарат цій категорії пацієнтів не рекомендується.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

У разі виникнення побічних реакцій з боку нервової системи (запаморочення, збудження, судоми) слід утриматися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

Діти.

Протипоказаний дітям до 3 років.

Препарат слід з обережністю застосовувати дітям від 3 років у ділянці обличчя, оскільки він може спричинити бронхоспазм.

Спосіб застосування та дози.

Нанести невелику кількість бальзаму на окремі ділянки і втирати у шкіру: при головному болю – у ділянку скроні і потилиці; при нежиті – під ніздрями; при застудних захворюваннях – у ділянку грудей, спини, живота; при укусах комах – на місце укусу.

Тривалість лікування залежить від індивідуальних особливостей пацієнта, перебігу захворювання і визначається досягнутим терапевтичним ефектом, характером комплексної терапії та переносимістю препарату.

Передозування.

Можливе посилення проявів побічних реакцій, відчуття сильного тепла та печіння.

При випадковому потрапленні внутрішньо можливі біль у животі, нудота, блювання, діарея, симптоми пригнічення центральної нервової системи, запаморочення, атаксія, судоми, припливи, сонливість, утруднення дихання.

Лікування: змити нанесений препарат водою з милом, промивання шлунка, симптоматична терапія.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, кропив'янку, свербіж, подразнення шкіри та слизових, почервоніння, дерматит, включаючи контактний дерматит, особливо у дітей.

З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, збудження; можливе виникнення судом, спричинених камфорою.

З боку дихальної системи: при застосуванні препарату можливе збільшення ймовірності та частоти виникнення спазму бронхів, особливо у дітей.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дослідження щодо взаємодії препарату з іншими лікарськими засобами не проводилися.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 4 г у металевій баночці; по 1 баночці у картонній пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.