

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГЛОДУ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 флакон містить настойки плодів глоду (*Crataegi fructus*) (1:10) (екстрагент – етанол 70 %) – 25 мл або 100 мл;

допоміжні речовини, крім екстрагенту, відсутні.

Лікарська форма. Настойка.

Рідина червонувато-коричневого кольору. У процесі зберігання можливе випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Тернофарм»

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються у кардіології.

Код АТС С01Е В04.

Біологічно активні речовини, що містяться у плодах глоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти) посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза.

Препарат добре всмоктується при застосуванні внутрішньо. Ефект настає через 30 хв – 1 годину.

Показання для застосування.

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторні дистонії), а також як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Протипоказання.

Індивідуальна непереносимість компонентів препарату. Виражена артеріальна гіпотензія і брадикардія.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не рекомендується застосовувати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується застосовувати жінкам у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Слід утримуватись від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

Діти.

Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Приймати внутрішньо до їди.

Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настойки, дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту (нормалізація артеріального тиску, зменшення серцебиття).

Передозування.

При значному перевищенні дози можливе виникнення сонливості, брадикардія, зниження артеріального тиску, які вимагають припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії.

Побічні ефекти.

Рідко спостерігаються сонливість, значне уповільнення серцевого ритму, алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат може посилювати дію серцевих глікозидів, снодійних, седативних, гіпотензивних засобів. Прийом із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом із цизапридом.

Термін придатності.

4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах-крапельницях, по 100 мл у флаконах скляних.

Категорія відпуску.

Без рецепта.