

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН**  
**(HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* водню пероксид;

100 мл розчину містить водню пероксиду (30 %) 10 г;

*допоміжні речовини:* натрію бензоат (Е 211), вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

Прозора безбарвна рідина.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПАТ «Фітофарм».

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Код АТС D08A X01.

При контакті розчину перекису водню з uszkodженою шкірою та слизовими оболонками вивільняється активний кисень, який сприяє очищенню ранової поверхні та інактивації органічних речовин (протеїн, кров, гній). При застосуванні препарату відбувається лише тимчасове зменшення кількості мікроорганізмів. Препарат має кровоспинний ефект.

**Показання для застосування.**

Препарат застосовують для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому uszkodженні тканин, носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонтитах, ангінах, гінекологічних захворюваннях, а також при гнійних ранах.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Застосування розчину на пов'язку забезпечує безболісне зняття її з рани. Велика кількість піни, що утворюється, сприяє механічному очищенню рани від гною і тканинного детриту. Препарат слід з обережністю застосовувати для обробки глибоких ран та зрошення порожнин, враховуючи можливість емболій.

Препарат нестабільний у лужному середовищі, у присутності металів, складних радикалів деяких оксидантів, а також в освітленому і теплому місці. Слід уникати потрапляння розчину в очі.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Застосовують.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не впливає.

**Діти.**

Застосовують.

**Спосіб застосування та дози.**

Розчин Перекису водень наносять на uszkodжену ділянку шкіри для дезінфекції ран *per se* (тобто без розведення). Для полоскання розчиняють 1 столову ложку в 1 склянці води; для аплікацій, обробки ранових поверхонь, зупинки кровотечі (капілярної) уражені ділянки обробляють тампоном, просоченим розчином перекису водню. Тривалість лікування залежить від досягнутого ефекту.

**Передозування.**

Не спостерігалось.

**Побічні ефекти.**

Можливе відчуття печіння в момент обробки рани. У деяких випадках при індивідуальній чутливості до компонентів препарату можливе виникнення місцевих алергічних реакцій. При тривалому застосуванні для обробки слизової оболонки рота можлива гіпертрофія сосочків язика.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Взаємодія поки що невідома.

**Термін придатності.**

2 роки.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 мл, 40 мл, 100 мл, 200 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.