

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПЕРТУСИН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 г сиропу містить: рідкого екстракту чебрецю трави (1:1) *Scrypli herba* (1:1) (екстрагент – етанол 30 %) – 12 г; калію броміду – 1 г;
допоміжні речовини: сироп цукровий, етанол 80 %.

Лікарська форма . Сироп.

Рідина від світло-коричневого до темно-коричневого кольору з присмним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні засоби. Код АТC R05C A10.

Пертусин відноситься до групи секретомоторних засобів. Препарат помякшує кашель та чинить заспокійливу дію. Пертусин стимулює фізіологічну активність миготливого епітелію і перистальтичні рухи бронхіол, сприяючи просуванню мокротиння із нижніх відділів дихальних шляхів у верхні та його виведенню.

Показання для застосування.

Симптоматичне лікування запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем з утрудненим відходженням мокротиння: бронхіти, трахеїти, пневмонії, коклюш.

Протипоказання.

Індивідуальна непереносимість компонентів препарату, у тому числі бромідів, декомпенсована серцева недостатність, артеріальна гіпотензія, виражений атеросклероз, анемія, захворювання нирок, цукровий діабет, алкоголізм.

Підвищена чутливість до компонентів препарату або інших рослин родини Губоцвітних (*Lamiaceae*), а також чутливі до селери та пилюк берези (можлива перехресна реакція); дитячий вік – з 4 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При застосуванні препарату слід дотримуватися рекомендованих доз. Хворим на цукровий діабет перед застосуванням препарату необхідна обов'язкова консультація лікаря. Дітям від 4 до 6 років препарат слід розводити прокип'яченою водою. 1 мл сиропу містить від 8,5 % до 11 % етанолу.

Якщо під час лікування препаратом погіршується симптоматика та/або з'являються задишка, підвищення температури тіла, гнійне мокротиння, необхідно проконсультуватися з лікарем. Якщо протягом одного тижня симптоматика зберігається, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Через відсутність достатніх даних не рекомендується застосовувати препарат у ці періоди.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Оскільки препарат містить спирт, пацієнтам після застосування препарату слід проявляти обережність при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти.

Застосовувати дітям віком до 4 років за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати внутрішньо.

Дорослим і дітям віком від 12 років призначати по 1 столовій ложці 3 рази на день. Дітям віком від 4 до 6 років – по 1/2 чайної ложки (2,5 мл), від 6 до 9 років – по 1 чайній ложці (5 мл), від

9 до 12 років – по 1 десертній ложці 3 рази на день. Дітям віком до 6 років разову дозу препарату (1/2 чайної ложки) необхідно розчинити у 20 мл (2 десертні ложки) охолодженої кип'яченої води.

Тривалість лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання, характеру комплексної терапії та переносимості препарату.

Передозування.

Можливі явища бромізму: шкірні висипи, риніт, кон'юнктивіт, гастроентероколіт, загальна слабкість, атаксія, брадикардія.

Слід відмінити застосування препарату та провести симптоматичне лікування.

Побічні ефекти.

При тривалому застосуванні можливі явища бромізму: шкірні висипи, риніт, кон'юнктивіт, гастроентероколіт, загальна слабкість, атаксія, брадикардія.

Можливі виникнення алергічних реакцій, шлунково-кишкових розладів (включаючи нудоту, блювання, діарею).

У разі будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря!

Термін придатності.

4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25°C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

Упаковка.

По 50 г або 100 г у флаконі в пачці або без пачки.

Категорія відпуску.

Без рецепта.