

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

СТИМОЛ® (STIMOL®)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 пакетик містить цитруліну малату 1 г;

допоміжні речовини: натуральний розчин апельсинової сангрії, концентрований розчин натрію гідроксиду, вода очищена.

Лікарська форма. Розчин оральний.

Безбарвна або жовтувата рідина з апельсиновим запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

БІОКОДЕКС.

Юридична адреса: 7, авеню Гальєні, 94250 Жантиллі – Франція/7 avenue Gallieni 94250 Gentilly – France.

Адреса виробництва: 1 Авеню Блез Паскаль, 60000 Бове, Франція/1 avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais, France.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Амінокислоти та їх похідні.

Код АТС А16А А.

Стимол® – це комбінація L-цитруліну та малату. Малат стимулює цикл Кребса та активує механізм утворення енергії на клітинному рівні, знижує рівень лактату в крові та тканинах, запобігає розвитку молочнокислого ацидозу та підвищує рівень АТФ. Цитрулін – це одна з амінокислот, яка входить до циклу сечовини, активує утворення та виведення сечовини з організму.

Стимол® швидко всмоктується у кишечнику. Після застосування 4 г цитруліну малату максимальна концентрація досягається через 45 хвилин і перевищує в 6-15 разів базальний рівень у плазмі крові. Препарат виводиться протягом 5-6 годин нирками.

Показання для застосування.

Симптоматичне лікування функціональної астенії:

- фізична астенія;
- психічна астенія;
- постінфекційна астенія;
- післяопераційна астенія;
- астенія у літньому віці;
- астенія ендокринного походження (при цукровому діабеті);
- астенія у спортсменів (препарат знімає біль у м'язах після інтенсивних тренувань);
- вегето-судинна дистонія за гіпотонічним типом;
- алкогольно-абстинентний синдром;
- сексуальна астенія.

Препарат показаний при симптомах астенії: загальна слабкість, емоційна лабільність, хронічна втома, низька працездатність, сонливість.

Препарат показаний при м'язовому болю та судомах, спричинених накопиченням лактату після фізичних навантажень. Рекомендований у період реконвалесценції при захворюваннях, що призводять до розвитку астеновегетативного синдрому.

Протипоказання. Підвищена чутливість до препарату. Виразка шлунка або дванадцятипалої кишки.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Один пакетик Стимулу® містить приблизно 30 мг (1,3 ммоль) натрію для доведення рН розчину до 3,3. Це необхідно враховувати при застосуванні препарату хворим, які перебувають на безсольовій дієті.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Ефективність і безпека застосування препарату дітям до 6 років вивчені недостатньо. Препарат застосовувати дітям віком від 6 років.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати внутрішньо, попередньо розчинивши вміст пакетика в 100 мл води або підсолодженого напою. Приймати під час їди.

Дорослим: по 1 пакетуку 3 рази на день.

Дітям віком від 6 років: по 1 пакетуку 2 рази на день.

Рекомендований термін лікування – 4 тижні.

Передозування. Не описане.

Побічні ефекти. В окремих випадках можливий незначний біль в епігастрії, алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 10 мл у пакетуку. По 18 пакетиків у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.