

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**РИНІТАЛ**  
**(RHINITAL®)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить Luffa operculata D4 25 мг, Galphimia glauca D3 25 мг, Cardiospermum D3 25 мг;

*допоміжні речовини:* лактози моногідрат, магнію стеарат, крохмаль пшеничний.

**Лікарська форма.** Таблетки.

Білі чи майже білі, двоплощинні таблетки зі скошеною кромкою.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ  
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.

Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

Ринітал являє собою гомеопатичний комбінований препарат. Активні речовини ефективні відносно таких типових симптомів як закладеність носа, свербіж у носі і глотці, чхання, сльозотеча, відчуття печіння в очах.

**Показання для застосування.**

Алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів: сезонний алергічний риніт (полліноз) і цілорічний алергічний риніт.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Не застосовувати дітям віком до 2 років.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У такому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

До початку лікування необхідно обстежитися для уточнення діагнозу.

Не слід застосовувати лікарський засіб тривалий час без консультації лікаря.

Препарат містить крохмаль пшеничний, тому пацієнтам з підвищеною чутливістю або непереносимістю глютену не слід приймати цей препарат.

Препарат містить лактозу, тому пацієнти з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не повинні застосовувати препарат.

При збереженні або нез'ясованості симптоматики, а також із появою нових симптомів слід проконсультуватися з лікарем.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Ринітал у період вагітності або годування груддю можна застосовувати лише після ретельної оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Не впливає.

**Діти.** Препарат призначають дітям віком від 2 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Дітям віком від 2 до 12 років: при гострих станах – по 1 таблетці кожні 2 години (але не більше 8 таблеток на добу) до поліпшення стану; далі приймати по 1 таблетці 3 рази на добу;

дорослим і дітям старше 12 років: при гострих станах – по 1 таблетці щогодини (але не більше 12 таблеток на добу) до поліпшення стану; далі приймати по 1-2 таблетки 3 рази на добу;

профілактика сезонного алергічного риніту: по 1 таблетці 3 рази на добу, починаючи застосовувати препарат за 6 тижнів до появи пилку, що спричиняє алергію.

Ринітал добре переноситься, тому його можна застосовувати для тривалого лікування.

Таблетки приймати за півгодини до їди або через півгодини після їди, даючи їм повільно розчинитися у роті. При лікуванні дітей віком до 3 років таблетку рекомендується розчиняти у невеликій кількості води (наприклад у чайній ложці).

**Передозування.** У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.

**Побічні ефекти.** У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи висипання на шкірі, шлунково-кишкові розлади. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Термін придатності.** 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.