

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЦИНАБСИН
(CINNABSIN®)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 таблетка містить Cinnabaris D3 25 мг, Echinacea D1 25 мг, Hydrastis D3 25 мг, Kalium bichromicum D3 25 мг;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, магнію стеарат, крохмаль пшеничний.

Лікарська форма. Таблетки.

Білі або майже білі, іноді з окремими темними крапками, двоплощинні таблетки зі скошеною кромкою.

Назва і місцезнаходження виробника.

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.
Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Цинабсин являє собою гомеопатичний комбінований препарат *Cinnabaris* швидко і надійно звільняє від таких характерних симптомів запалення навколоносових пазух як головні болі, слезотеча, а також від невралгій у ділянці обличчя. *Hydrastis* і *Kalium bichromicum* діють головним чином при підгострому і хронічному перебігу захворювання, що часто має місце при тривалому синуситі. Усі три інгредієнти сприяють зняттю набряку слизових оболонок і відновленню носового дихання *Echinacea* сприяє загальній підтримці імунної системи.

Показання для застосування.

Гостре і хронічне запалення придаткових пазух носа (синусити).

Протипоказання.

Препарат не можна призначати при відомій гіперчутливості до хрому, ехінацеї та інших різновидів родини складноцвітих або до будь-якого компонента препарату. Цинабсин не слід застосовувати при туберкульозі, лейкозі, колагенозах, розсіяному склерозі, імунодефіцитних станах (у тому числі ВІЛ-інфекції) при пригніченому стані імунітету (наприклад після трансплантації органів або кісткового мозку, хіміотерапії) або хронічних вірусних захворюваннях.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове і тимчасове погіршення. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

Препарат містить крохмаль пшеничний, тому пацієнтам з підвищеною чутливістю або непереносимістю глютену не слід приймати цей препарат.

Препарат містить лактозу, тому пацієнти з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не повинні застосовувати препарат.

При збереженні або нез'ясованості симптоматики, а також із появою нових симптомів слід проконсультуватися з лікарем.

Через недостатність клінічних даних не рекомендується застосовувати препарат дітям віком до 2 років.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Цинабсин у період вагітності або годування груддю можна застосовувати лише після ретельної оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат призначають дітям віком від 2 років.

Спосіб застосування та дози.

Дітям віком від 2 до 5 років: при гострих станах – по 1 таблетці 3 рази на добу до поліпшення стану. При подальшому лікуванні продовжувати приймати по

1 таблетці 3 рази на добу;

дітям віком від 6 до 11 років: при гострих станах – по 1 таблетці кожні 2 години (але не більше 6 таблеток на добу) до поліпшення стану. При подальшому лікуванні приймати

по 1 таблетці 3 рази на добу;

дорослим і дітям старше 12 років: при гострих станах – по 1 таблетці щогодини (але не більше 12 таблеток на добу) до поліпшення стану. При подальшому лікуванні приймати

по 1-2 таблетки 3 рази на добу.

При хронічних станах дітям і дорослим – по 1 таблетці 3 рази на добу, рекомендована тривалість лікування – 4-6 тижнів.

Цинабсин не рекомендується приймати понад 8 тижнів без консультації з лікарем.

Таблетки приймати за півгодини до їди або через півгодини після їди, даючи їм повільно розчинитися в роті. Дітям віком до 3-х років рекомендується для зручності застосування розчиняти таблетку у невеликій кількості води (наприклад у чайній ложці).

Передозування.

У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.

Побічні ефекти.

У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи висипання на шкірі, шлунково-кишкові розлади, включаючи нудоту, блювання. У хворих, які застосовували інші препарати, що містять ехінацею, відзначалися алергічні реакції (висипання на шкірі, свербіж, в окремих випадках – набряк обличчя, диспное, запаморочення і зниження артеріального тиску). При розвитку таких небажаних реакцій слід припинити прийом препарату та проконсультуватися з лікарем.

При посиленні слиновиділення після прийому препарату Цинабсин рекомендується зменшити дозу або припинити прийом препарату.

При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.