

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ЕСПОЛ**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* перцю стручкового екстракт густий (з вмістом суми капсаїциноїдів 1 %), диметилсульфоксид;  
1 г мазі містить перцю стручкового екстракту густого (з вмістом суми капсаїциноїдів 1 %) – 0,1 г ; диметилсульфоксиду - 0,03 г ;  
*допоміжні речовини:* олія коріандру ефірна, олія лавандова ефірна, хлороформ, ланолін, парафін, парафін білий м'який .

**Лікарська форма.** Мазь.

Мазь від світло-коричневого до червонувато-коричневого кольору зі слабким специфічним запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ВАТ «НИЖФАРМ». Російська Федерація, 603950, м . Нижній Новгород, ГСП-459,  
вул. Салганська, 7.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються місцево при м'язовому та суглобовому болю. Код АТС М02А В.

Препарат чинить місцевоподразнювальну, відволікаючу та анальгезуючу дію. Викликає розширення поверхневих судин, гіперемію, відчуття теплоти та покращання кровообігу у шкірі та підшкірній клітковині. При застосуванні мазі через 10-15 хвилин з'являється гіперемія (почервоніння шкіри) і відчуття тепла.

**Показання для застосування.**

М'язовий та суглобовий біль (невралгії, радикуліт, деформуючий артроз, люмбаго, попереково-крижовий радикуліт), забиття, розтягнення та розрив зв'язок без порушення цілісності шкірних покривів, лікування наслідків вивихів та переломів.

**Протипоказання.**

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату, порушення цілісності шкірних покривів. Серцево-судинна недостатність, виражений атеросклероз, стенокардія, порушення функції нирок або печінки, інсульт, інфаркт міокарда, коматозні стани, глаукома, катаракта.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Не допускати попадання мазі в очі, на слизові оболонки, ушкоджені ділянки шкіри та на шкіру з проявами алергії. Не наносити на шкіру обличчя. При появі алергічних реакцій застосування мазі слід припинити, залишки мазі стерти серветкою, змоченою у мильній воді, та звернутися до лікаря. При випадковому потрапленні препарату в очі слід негайно промити їх проточною водою. Після застосування мазі необхідно вимити руки з милом.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю* . Протипоказано.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Слід застосовувати з обережністю з урахуванням впливу на центральну нервову систему, зокрема ймовірність запаморочення.

*Діти.* Клінічні дані щодо безпеки застосування препарату дітям відсутні.

**Спосіб застосування та дози.**

Злегка втирають у шкіру 2- 3 г мазі 2-3 рази на добу. Для посилення ефекту можна накласти суху зігріваючу пов'язку. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально, зазвичай тривалість лікування становить 1-10 діб.

**Передозування.**

Передозування препарату може викликати виникнення алергічних реакцій (кропив'янка, набряк) та посилення проявів побічної дії, що вимагає припинення застосування препарату та проведення симптоматичної терапії.

**Побічні ефекти.**

Можливі алергічні реакції (дерматити, шкірний висип, ангіоневротичний набряк, свербіж, лущення шкіри, відчуття печіння у місці нанесення мазі, гіперемія шкіри, еритема), бронхоспазм, запаморочення, головний біль, безсоння, адинамія, нудота, блювання. Ці явища швидко минають після відміни препарату. У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Диметилсульфоксид, який входить до складу препарату, посилює дію етанолу (алкоголь гальмує виведення препарату) та інсуліну, кислоти ацетилсаліцилової, бутадіону; препаратів дигіталісу, хінідину, нітрогліцерину, антибіотиків (стрептоміцину, мономіцину тощо), хлорамфеніколу, рифампіцину, гризеофульвіну, сенсibiliзує організм до засобів для наркозу. Слід враховувати посилення препаратом як специфічної активності, так і токсичності лікарських засобів. Можна застосовувати разом з нестероїдними протизапальними засобами у комплексній терапії деформуючого артрозу і ревматоїдного артриту; у комбінації з антимікробними засобами місцевої дії (лінімент синтоміцину) – для лікування стрептодермії.

**Термін придатності.** 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 20 °С.

**Упаковка.**

По 30 г у тубі. По 1 тубі у картонній пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.