

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**КЛІМАКТОПЛАН**  
(KLIMAKTOPLAN®)

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить Cimicifuga D2 25 мг, Ignatia D3 25 мг, Sepia D2 25 мг, Sanguinaria D6 25 мг;

*допоміжні речовини:* лактози моногідрат, магнію стеарат, крохмаль пшеничний.

**Лікарська форма.** Таблетки.

Сірі, двоплощинні таблетки зі скошеним краєм, іноді злегка плямисті.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ

Ottostrasse 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.

Deutsche Homoeopathie-Union DHU–Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.

**Фармакотерапевтична група.**

Комплексний гомеопатичний препарат. Інші препарати для лікування гінекологічних захворювань. Код АТС: G02CX.

Клімактоплан містить чотири інгредієнти, які зумовлюють фармакологічний ефект препарату.

*Cimicifuga* впливає на гіпоталамус, усуваючи або послаблюючи припливи жару, нервові збудження і депресії. *Sepia* регулює спільні функції гормонів кори надниркових залоз, статевих органів і гіпофіза. *Sepia*, як і *Ignatia*, насамперед діє на психічні реакції, однак вона впливає також на напади пітливості, припливи жару, головний біль і стан знесилля. *Sanguinaria* особливо ефективна при припливах жару, які супроводжуються минулим рум'янцем і прискореним серцебиттям, а також при головному болю типу мігрені.

Отже, Клімактоплан за рахунок поєднання специфічних інгредієнтів є лікарським засобом, призначеним для лікування комплексу симптомів, типових для клімактеричного періоду. Завдяки добрій переносимості Клімактоплан можна приймати протягом тривалого часу.

**Показання для застосування.**

Клімактеричні розлади: припливи жару, посилене потовиділення, відчуття серцебиття, запаморочення, свербіж, внутрішнє занепокоєння, порушення сну, депресивний стан, нервова збудливість.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до діючих речовин або до будь-якої з допоміжних речовин препарату.

**Особливі застереження.**

Препарат містить лактозу, тому пацієнти з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не повинні застосовувати препарат.

Однією з допоміжних речовин, що входять до складу препарату, є пшеничний крохмаль. В зв'язку з цим таблетки не слід застосовувати пацієнтам з підвищеною чутливістю або непереносимістю глютену.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Не застосовують у період вагітності та годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не впливає.

#### ***Діти.***

Не застосовують дітям.

#### **Спосіб застосування та дози.**

Приймають по 1-2 таблетки 3 рази на день. Максимальна добова доза становить 6 таблеток. Таблетки приймати за півгодини до їди або півгодини після їди, повільно розсмоктуючи в ротовій порожнині. Якщо необхідно, таблетки можна розчинити в невеликій кількості води. У разі відсутності покращення дозування слід змінити. Клімактоплан слід застосовувати не менше 3 місяців. Лікування може бути продовжено у випадку необхідності.

#### **Передозування.**

Передозування не спостерігалось.

#### **Побічні ефекти.**

При застосуванні препарату можливі реакції гіперчутливості, можуть виникнути менструальні та носові кровотечі або збільшитися частота менструальних кровотеч.

*Примітка.* При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове погіршення наявних симптомів захворювання (первинне погіршення). У цьому випадку необхідно припинити застосування препарату і проконсультуватися з лікарем.

#### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

На цей час не відома.

Застосування гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських препаратів.

Пацієнтам слід проконсультуватися з лікарем, якщо вони приймають або приймали в недавньому минулому будь-які інші ліки, включаючи лікарські засоби, які можна придбати без рецепта.

*Примітка.* Дія гомеопатичних лікарських засобів може бути різною залежно від загальних негативних факторів, пов'язаних із шкідливими звичками (стимулятори: наприклад, кава або чай, алкоголь, куріння).

#### **Термін придатності. 5 років.**

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

#### **Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С в сухому, недоступному для дітей місці.

#### **Упаковка.**

По 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці.

#### **Категорія відпуску.**

Без рецепта.