

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ГОМЕОВОКС®
(HOMEOVOX®)

Склад:

діючі речовини:

1 таблетка містить:

Aconitum napellus	3CH	0,091 мг;
Arum triphyllum	3CH.....	0,091 мг;
Ferrum phosphoricum	6CH.....	0,091 мг;
Calendula officinalis	6CH.....	0,091 мг;
Spongia tosta	6CH.....	0,091 мг;
Belladonna	6CH	0,091 мг;
Mercurius solubilis	6CH.....	0,091 мг;
Hepar sulfur	6CH.....	0,091 мг;
Kalium bichromicum	6CH.....	0,091 мг;
Populus candicans	6CH.....	0,091 мг;
Bryonia	3CH.....	0,091 мг;

допоміжні речовини: сахароза, лактоза моногідрат, крохмаль кукурудзяний, магнію стеарат, акація(гуміарабік), желатин, тальк, віск білий, віск карнаубський.

Лікарська форма. Таблетки, вкриті оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості: білі з блискучою поверхнею двоопуклі, вкриті оболонкою таблетки. Без запаху.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний засіб.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Діючі компоненти препарату чинять протизапальну та муколітичну дію.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання. Комплексне симптоматичне лікування ларингіту, який проявляється втомлюваністю голосових зв'язок, втратою голосу, охриплістю.

Протипоказання.

- Підвищена чутливість до діючих або допоміжних речовин препарату.
- Рідкісна спадкова непереносимість фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція або сахарозо-ізомальтазна недостатність.
- Рідкісна спадкова непереносимість галактози, дефіцит Lapp-лактази або глюкозо-галактозна мальабсорбція.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Про випадки взаємодії з іншими лікарськими засобами не повідомлялось.

Особливості застосування.

Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб

Застосування у період вагітності або годування груддю. Безпека застосування препарату Гомеовокс® у період вагітності або годування груддю не досліджувалась, тому препарат у цей період можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не виявлено.

Спосіб застосування та дози.

Для перорального застосування

Дорослі та діти віком від 2 років ів:

- для профілактики: по 2 таблетки 5 разів на добу;

- лікування: по 2 таблетки через 1 годину.

Повільно розсмоктувати у роті до повного розчинення.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Гомеовокс®, таблетки, вкриті оболонкою рекомендовано для дітей віком від 2 років. Дітям віком до 6 років, перед прийомом таблетку рекомендується подрібнити та розчинити у воді.

Передозування. Про випадки передозування препарату не повідомлялось.

Побічні реакції. При застосуванні препарату можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.

Зберігати в оригінальній упаковці. Не потребує особливих умов зберігання.

Упаковка. По 20 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

БУАРОН, Франція / BOIRON, France.

Місцезнаходження виробника.

Авеню де л'Уест Ліоне, 2 - Мессімі 69510 Франція /

2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 MESSIMY- France.

Заявник.

БУАРОН, Франція / BOIRON, France.

Місцезнаходження заявника.

Авеню де л'Уест Ліоне, 2 - Мессімі 69510 Франція /

2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 MESSIMY- France.