

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
КОРИЗАЛІЯ®
(CORYZALIA®)

Склад:

діючі речовини:

1 таблетка містить:

Allium sera	3CH	0,333 мг;
Belladonna	3CH	0,333 мг;
Sabadilla	3CH.....	0,333 мг;
Kalium bichromicum	3CH.....	0,333 мг;
Gelsemium	3CH.....	0,333 мг;
Pulsatilla	3CH.....	0,333 мг;

допоміжні речовини: сахароза, тальк, акація (гуміарабік), магнію стеарат, желатин, віск білий, віск карнаубський.

Лікарська форма. Таблетки, вкриті оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості. Білі з блискучою поверхнею двоопуклі, вкриті оболонкою таблетки. Без запаху.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний засіб.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Фармакологічні властивості препарату зумовлені комплексною дією активних компонентів, спрямованих на зняття симптомів застуди та риніту.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання. У складі комплексного симптоматичного лікування застуди та риніту.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до діючих або допоміжних речовин препарату.

Пацієнтам з рідкісною спадковою непереносимістю фруктози, глюкозо-галактозною малабсорбцією або сахарозо-ізомальтазною недостатністю не слід приймати цей засіб.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не виявлено.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Оскільки безпека застосування Коризалії® у період вагітності або годування груддю не досліджувалась, препарат у цей період застосовують тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не виявлено.

Спосіб застосування та дози.

Для перорального застосування.

Дорослі та діти віком від 2 років: по 1 таблетці кожну годину протягом перших 12 годин. При покращенні частоту прийому зменшити.

Повільно розсмоктувати у роті до повного розчинення.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Коризалія®, таблетки, вкриті оболонкою, рекомендовані для дітей віком від 2 років. Дітям віком до 6 років перед прийомом таблетку рекомендується подрібнити та розчинити у воді.

Передозування. Про випадки передозування препарату не повідомлялось.

Побічні реакції. У осіб з підвищеною чутливістю до компонентів препарату можливий розвиток алергічних реакцій.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.

Зберігати в оригінальній упаковці. Не потребує особливих умов зберігання.

Упаковка. По 20 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

БУАРОН, Франція / BOIRON, France.

Місцезнаходження виробника.

Авеню де л'Уест Ліоне, 2-Мессімі 69510 Франція /

2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 MESSIMY – France.

Заявник.

БУАРОН, Франція / BOIRON, France.

Місцезнаходження заявника.

Авеню де л'Уест Ліоне, 2-Мессімі 69510 Франція /

2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 MESSIMY – France.