

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

**АНЕСТЕЗОЛ**<sup>□</sup>  
(ANAESTHESOLUM<sup>□</sup>)

### Склад лікарського засобу:

*діючі речовини:* 1 супозиторій містить бензокаїну (0,1 г) 100 мг, вісмуту субгалату (0,04 г) 40 мг, цинку оксиду (0,02 г) 20 мг, ментолу (0,004 г) 4 мг;

*допоміжні речовини:* поліетиленоксид1500, поліетиленоксид400.

**Лікарська форма.** Супозиторії.

Супозиторії зеленувато-жовтого кольору, кулеподібної форми .

### Назва і місцезнаходження виробника.

АТ «Лекхім-Харків». Україна, 61115, м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, 36.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби для лікування геморою і анальних тріщин для місцевого застосування Місцевоанестезуючі засоби. Код АТС C05A D.

Анестезол – комплексний лікарський засіб, терапевтична дія якого зумовлена фармакологічними властивостями активних компонентів, що входять до його складу. Анестезол чинить місцевоанестезуючу, протизапальну та в'язучу дію.

### Показання для застосування.

Симптоматична терапія геморою та тріщин заднього проходу.

### Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Підвищена чутливість до іншихамідниханестетиків

### Особливі застереження.

При тривалому застосуванні препарату необхідний контроль показників крові.

### Застосування у період вагітності або годування груддю.

Жінкам у період вагітності або годування груддю препарат призначають, враховуючи співвідношення ризик/користь.

### Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

При лікуванні препаратом рекомендується утримуватися від керування транспортними засобами і виконання робіт, які потребують підвищеної уваги і точної координації.

### Діти.

Даних щодо застосування препарату дітям немає.

### Спосіб застосування та дози.

Перед застосуванням супозиторія необхідно:

- по лінії перфорації блістерної упаковки відірвати один супозиторій у первинній упаковці;

- далі необхідно потягнути за край плівки, розриваючи її у різні боки, і звільнитисупозиторій від первинної упаковки.

Препарат застосовують ректально. По 1 супозиторію 1-2 рази на добу після очисної клізми кишечника або самостійної дефекації.

Тривалість лікування визначає лікар, враховуючи перебіг та тяжкість захворювання, досягнутий терапевтичний ефект.

### Передозування.

При застосуванні в терапевтичних дозах передозування малоімовірне. Симптоми не описані.

### Побічні ефекти.

Іноді виникають алергічні реакції, шкірні висипання, свербіж. Препарат може зумовлювати послаблюючу дію, появу відчуття печіння у задньому проході. При тривалому застосуванні можуть розвинути реакції з боку крові ( метгемоглобінемія).

### Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій .

Не вивчалась.

**Термін придатності.** 3 роки.

### Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

### Упаковка.

По 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці

**Категорія відпуску.** Без рецепта.