

# ІНСТРУКЦІЯ

## для медичного застосування препарату

### АНГІО-ІН'ЄЛЬ (ANGIO-INJEEL®)

#### **Склад:**

*діючі речовини:* 1,1 мл розчину містить: Acidum formicicum D10 – 1,1 мг, Acidum formicicum D30 – 1,1 мг, Acidum formicicum D200 – 1,1 мг, Asclepias tuberosa D10 – 1,1 мг, Asclepias tuberosa D30 – 1,1 мг, Asclepias tuberosa D200 – 1,1 мг, Castoreum D10 – 1,1 мг, Castoreum D30 – 1,1 мг, Castoreum D200 – 1,1 мг, Crataegus D10 – 1,1 мг, Crataegus D30 – 1,1 мг, Crataegus D200 – 1,1 мг, Nitroglycerinum D10 – 2,2 мг, Nitroglycerinum D30 – 2,2 мг, Nitroglycerinum D200 – 2,2 мг, Plumbum jodatum D10 – 1,1 мг, Plumbum jodatum D30 – 1,1 мг, Plumbum jodatum D200 – 1,1 мг, Selenicereus grandiflorus D10 – 1,1 мг, Selenicereus grandiflorus D30 – 1,1 мг, Selenicereus grandiflorus D200 – 1,1 мг, Spigelia anthelmia D10 – 2,2 мг, Spigelia anthelmia D30 – 2,2 мг, Spigelia anthelmia D200 – 2,2 мг;

*допоміжні речовини:* натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

**Лікарська форма.** Розчин для ін'єкцій.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, постінфекційний міокардит; нейроциркуляторна дистонія.

##### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

##### **Спосіб застосування та дози.**

Разова доза: дорослим і дітям від 12 років – 1,1 мл, дітям від 2 до 3 років – 0,3 мл, дітям від 3 до 6 років – 0,6 мл, дітям від 6 до 12 років – 0,7 мл. Застосовувати разову вікову дозу 1 раз на добу протягом 2-3 діб, а потім 1-3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньовенних ін'єкцій, а також в акупунктурні точки або перорально. При тяжких станах разову вікову дозу застосовувати до 3 раз на добу протягом перших 2-3 днів лікування, а потім – 1-3 рази на тиждень.

Препарат приймати перорально, розчинивши разову дозу в 5-10 мл води, розчин слід випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого можна змінювати тривалість курсу лікування та спосіб застосування.

Курс лікування – 2-5 тижнів.

##### **Побічні реакції.**

Реакції гіперчутливості.

##### **Передозування.**

Не відзначалося.

##### **Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар індивідуально з урахуванням користі/ризиків.

##### **Діти.**

Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 2 років.

**Особливості застосування.**

Не застосовувати при захворюваннях щитовидної залози без попередньої консультації лікаря.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Невідома.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Сумісний з іншими лікарськими засобами.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* Препарат оптимізує стан вегетативної нервової системи, усуває спазм коронарних судин, має нітратоподібну, кардіо- та вазопротекторну дію. Дія препарату ґрунтується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

**Фармацевтичні характеристики.**

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозорий безбарвний розчин без запаху і практично вільний від часток.

**Несумісність.**

Невідома.

**Термін придатності.** 5 років.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

5 ампул та 100 (5x20) ампул по 1,1 мл у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробник.**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ/  
Biologische Heilmittel Heel GmbH.

**Місцезнаходження.**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/  
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.