

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

ГАЛСТЕНА[□]
(GALSTENA)

Склад лікарського засобу:

100 мл препарату містить: *діючі речовини*: Carduus D1 2 мл, Taraxacum D6 10 мл, Chelidonium D6 10 мл, Natrium sulfuricum D12 10 мл, Phosphorus D12 10 мл;
допоміжні речовини: етанол 43 % (м/м);
1 мл розчину містить 25 крапель.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Прозора від безбарвного до ледь жовтуватого кольору рідина.

Назва і місцезнаходження виробника.

Ріхард Біттнер АГ,
Оссіахерштрассе 7, А-9560 Фельдкірхен, Австрія.

Фармакотерапевтична група . Комплексний гомеопатичний засіб.

Препарат має властивості гепатопротектора, холеретика та холекінетика, виявляє деяку спазмолітичну та протизапальну дію на гепатобіліарну систему.

Показання для застосування.

Для лікування гострих та хронічних захворювань печінки, жовчовивідних шляхів та міхура, у комплексній терапії хронічного панкреатиту.
Для захисту та відновлення печінки при застосуванні антибіотиків, протизастудних, знеболювальних, протизапальних та інших гепатотоксичних препаратів та алкоголю.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

На початку лікування препаратом можуть з'явитися прояви незначного посилення симптомів захворювання, що не потребують відміни препарату.
Оскільки Галстена[□] містить рослинні та інші природні компоненти, при зберіганні може спостерігатися незначна зміна смаку, прозорості або кольору розчину, що не призводить до зниження ефективності препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Інформація щодо будь-якого ризику від застосування препарату у період вагітності або годування груддю дотепер не зареєстрована. Препарат застосовують у період вагітності або годування груддю лише у випадках, якщо, на думку лікаря, очікувана користь для матері переважає потенціальний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Незважаючи на вміст спирту, препарат у рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати транспортними та механічними засобами.

Діти. Лікарський засіб призначають дітям від народження.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі та діти від 12 років: по 10 крапель препарату у чистому вигляді або розведеного в 1 столовій ложці води;

діти 5-12 років: по 5-7 крапель препарату, розведених в 1 столовій ложці води;

діти 2-4 роки: по 2-4 краплі препарату, розведених в 1 столовій ложці води;

діти від народження до 1 року: по 1 краплі препарату, розведений в 1 чайній ложці води або молока.

Приймати препарат 3 рази на добу.

На початку лікування, а також у випадках, що вимагають швидкого послаблення симптомів, рекомендований прийом препарату кожні півгодини до 8 разів на добу, до покращання стану, але не більше 3-х діб, після чого приймати 3 рази на добу.

Для досягнення максимального ефекту рекомендується приймати препарат Галстена у проміжках між прийомами їжі (за 30 хвилин до або через 1 годину після їди), потримати препарат деякий час у роті перед проковтуванням.

Тривалість прийому: гепатит, гепатоз, цироз печінки – не менше 3 місяців. Хронічний холецистит, жовчокам'яна хвороба, постхолецистектомічний синдром – 2-3 місяці. При необхідності курс можна повторити через 1 місяць. При дискінезіях жовчовивідних шляхів тривалість курсу лікування – 2-3 тижні. Для захисту клітин печінки після антибіотикотерапії та інших шкідливих впливів – 2-4 тижні.

Передозування. Випадків передозування не було зареєстровано.

Побічні ефекти.

У виняткових випадках в осіб з гіперчутливістю на будь-який компонент препарату можливе виникнення алергічних реакцій.

Взаємодія з лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування.

При застосуванні препарату Галстена у комплексній терапії разом з іншими препаратами рекомендовано дотримуватись 20-хвилинної перерви між прийомом лікарських засобів.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Лікарський засіб зберігати у щільно закритому флаконі в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 30°C у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 або 50, або 100 мл у флаконах-крапельницях із темного скла, у картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.