

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЗУБНІ КРАПЛІ
(DENTAL DROPS)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 мл препарату містить олії м'яти перцевої (в перерахуванні на 50 % ментол) 31 мг, камфори рацемічної 64 мг, настойки валеріани коренів (Valeriana radix) (1:5) (екстрагент - етанол 70 %) до 1 мл;
1 мл препарату містить 46 крапель.

Лікарська форма. Краплі.

Прозора рідина від жовтувато-бурого до червонувато-бурого кольору ароматного запаху.

Назва і місце знаходження виробника.

ПАТ "Фітофарм".
Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Засоби для місцевого застосування в стоматології.

Код АТС А01А D11.

Препарат чинить помірну знеболювальну, антисептичну та освіжаючу дію, зумовлену фармакологічними властивостями речовин, що входять до його складу.

Показання для застосування.

Симптоматичне лікування зубного болю різної етіології.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату, епілепсія, схильність до судомних нападів, бронхіальна астма; уникати контакту з ушкодженою слизовою оболонкою.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

У разі появи алергічних реакцій слід припинити застосування препарату і змити його залишки з місць застосування.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, краплі не рекомендується застосовувати жінкам в період вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Оскільки до складу препарату входить етанол при застосуванні слід утримуватися від керування автотранспортом і виконання потенційно небезпечних видів діяльності внаслідок можливих побічних реакцій (запаморочення, сонливість).

Діти.

Краплі не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Для заспокоєння зубного болю до хворого зуба прикладають ватний тампон, змочений 2 - 3 краплями препарату.

Передозування.

Можливий розвиток підвищеної чутливості до препарату, посилення побічних ефектів.

При випадковому потрапінні внутрішньо можливі: тяжкі прояви з боку шлунково-кишкового тракту, біль у животі, нудота, блювання, дарея, ректальні виразки, симптоми пригнічення центральної нервової системи, запаморочення, атаксія, судоми, втрата свідомості, припливи, сонливість, утруднення дихання, головний біль, збудження, порушення діяльності серця, зниження артеріального тиску.

Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

Подразнення слизової оболонки, відчуття печіння; головний біль, запаморочення, сонливість, атаксія, тремор, судоми, збудження; брадикардія; бронхоспазм. Іноді можуть виникати алергічні реакції, у тому числі, висипи на шкірі, кропив'янка, свербіж, еритема, анафілактичний шок.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.