

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ГЛІЦЕРИНОВІ СУПОЗИТОРІЇ «ФАРМІНА»**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* гліцерол;

1 супозиторій містить: гліцерину 86 % 0,75 г або 1,5 г;

*допоміжні речовини:* кислота стеаринова, натрію карбонатбезводний.

**Лікарська форма .** Супозиторії.

Безбарвні або з легким білим відтінком гігроскопічні свічки, у формі торпеди з ароматом мила, без плям та пухирців.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Фарміна Лтд.

вул.Ліпска, 44, 30-721 Краків, Польща.

**Фармакотерапевтична група. Код АТС.**

Проносні засоби Код АТС А06.

У чистому вигляді гліцерин має подразнювальну дію, яка зникає при додаванні води (до 30-50%), вазеліну, ланоліну. При введенні у пряму кишку супозиторії чинять легку подразнювальну дію на слизову оболонку і рефлекторним шляхом стимулюють дефекацію. При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв полегшує виведення калових мас.

**Показання для застосування.**

Запори різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе)

**Протипоказання .**

Підвищена чутливість до компонентів препарату Кишкова непрохідність, ниркова недостатність, апендицит, кровотечі, діарея, геморої в стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недиагностований біль у животі.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Не рекомендується застосовувати супозиторії курсом лікування більше 1 тижня.

З обережністю застосовувати при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні.

Перед та після застосування супозиторіїв слід ретельно вмити руки.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

У період вагітності препарат можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Невідомо чи екскретує гліцерин у грудне молоко, тому препарат лікар може призначати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не впливає.

**Діти.**

Немає обмежень.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовують по 1 супозиторію 1 раз на добу через 15-20 хв після сніданку.

Супозиторій вводять у пряму кишку і тримають там протягом не менше 5 хв, якщо не відбувається випорожнення раніше. Залишки супозиторіїв виводяться з організму разом із каловими масами. За необхідності дозу можна збільшити до 2 супозиторіїв на добу.

Дорослим і дітям старше 5 років призначають по 1 супозиторію (що містить 1,5 г гліцерину) 1 раз на добу. Дітям до 5 років - 1 супозиторій (що містить 0,75 г гліцерину) 1 раз на добу.

**Передозування.**

Часте рідке випорожнення. Проходить самостійно після відміни препарату.

**Побічні ефекти.**

Можливі алергічні реакції; біль, нудота, блювання, шлунково-кишкова кровотеча.

При тривалому застосуванні спостерігалися подразнення і неприємні відчуття в прямій кишці; іноді катаральний проктит.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Супозиторії з гліцерином можуть послабити дію інших ліків, які застосовуються ректально. Необхідно дотримуватись кількохгодинного інтервалу.

**Термін придатності .** 2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

Первинна упаковка - блістери з полівінілхлоридної плівки або алюмінієвої фольги.

По 5 супозиторіїв у блістері.

Вторинна упаковка - картонна коробка.

По 1 блістеру №5 разом з інструкцією для медичного застосування у картонній упаковці.

**Категорія відпуску.** Без рецепту.