

## ІНСТРУКЦІЯ

### для медичного застосування препарату ГЛІЦЕРИНОВІ СУПОЗИТОРІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ

#### Склад лікарського засобу:

*діюча речовина:* гліцерол;

1 супозиторій містить гліцеролу 1405 мг ;

*допоміжні речовини:* натрію стеарат, вода очищена.

**Лікарська форма .** Супозиторії ректальні.

Безбарвні або напівпрозорі супозиторії у формі торпеди, з маслянистою, гладенькою поверхнею, однорідні на зовнішній вигляд у місці розрізу, зі слабким характерним запахом.

#### Назва і місцезнаходження виробника.

Антибіотіче АТ.

707410, м . Ясси, вул. Валя Лупулуй, 1, Румунія, ЕС.

Тел.: +40 232 209 000, +40 372 065 000.

**Фармакотерапевтична група.** Інші проносні засоби. Код АТС А06А Х01 .

У чистому вигляді гліцерин має подразнювальну дію, яка зникає при додаванні води (до 30 -

50 %), вазеліну, ланоліну. При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв полегшує виведення калових мас . При введенні у пряму кишку гліцеринові супозиторії чинять легку подразнювальну дію на слизову оболонку та рефлекторним шляхом ініціюють процес дефекації.

**Показання для застосування .** Симптоматичне лікування запорів різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе) .

#### Протипоказання.

Підвищена чутливість до гліцерину чи до будь-якого інгредієнта препарату. Ниркова недостатність. Синдром подразненого кишечника, кишкова непрохідність, апендицит, кровотеча, діарея, геморої у стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недиагностований біль у животі, геморагічний ректоколіт.

#### Належні заходи безпеки при застосуванні.

З обережністю застосовувати при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні.

Перед та після застосуванням супозиторіїв слід ретельно вимити руки.

Не рекомендується застосовувати супозиторії курсом більше 1 тижня.

#### Особливі застереження.

**Застосування у період вагітності або годування груддю .**

Не застосовують цим категоріям пацієнтів.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Не впливає.

**Діти.** Дітям віком до 2 років препарат можна застосовувати лише у виключних випадках після консультації з лікарем, оскільки він може погіршувати нормальну функцію рефлексу дефекації.

#### Спосіб застосування та дози.

Застосовують ректально по 1 супозиторію 1 раз на добу через 15 - 20 хв після сніданку.

Супозиторії вводять у пряму кишку і утримують там протягом не менше 5 хв, якщо випорожнення не відбудеться раніше. Залишки супозиторіїв виводяться із організму разом з каловими масами.

Лікування запорів не повинно перевищувати 7 днів.

#### Передозування.

Симптомами передозування є часті рідкі випорожнення. У разі передозування слід відмінити препарат.

**Побічні ефекти.** Можливі алергічні реакції, біль, нудота, блювання, шлунково-кишкова кровотеча.

При тривалому застосуванні спостерігалися подразнення і неприємні відчуття у прямій кишці; іноді – катаральний проктит.

#### Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не вивчалась.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

**Упаковка.** По 6 супозиторіїв у стрипі. По 1 або 2 стрипи у паці з картону.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.