

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату ГЛІЦЕРИНОВІ СУПОЗИТОРІЇ ДЛЯ ДОРΟΣЛИХ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: гліцерол;

1 супозиторій містить гліцеролу 2100 мг ;

допоміжні речовини: натрію стеарат, вода очищена.

Лікарська форма . Супозиторії ректальні.

Безбарвні або напівпрозорі супозиторії у формі торпеди, з маслянистою, гладенькою поверхнею, однорідні на зовнішній вигляд у місці розрізу, зі слабким характерним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

Антибіотіче АТ.

707410, м . Ясси, вул. Валя Лупулуй, 1, Румунія, ЕС.

Тел.: +40 232 209 000, +40 372 065 000

Фармакотерапевтична група. Інші проносні засоби. Код АТС А06АХ01.

У чистому вигляді гліцерин має подразнювальну дію, яка зникає при додаванні води (до 30 - 50 %), вазеліну, ланоліну. При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв полегшує виведення калових мас. При введенні у пряму кишку гліцеринові супозиторії чинять легку подразнювальну дію на слизову оболонку та рефлекторним шляхом ініціюють процес дефекації.

Показання для застосування . Симптоматичне лікування запорів різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе) .

Противопоказання.

Підвищена чутливість до гліцерину чи до будь-якого інгредієнта препарату. Ниркова недостатність. Синдром подразненого кишечника, кишкова непрохідність, апендицит, кровотеча, діарея, геморої у стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недиагностований біль у животі, геморагічний ректоколіт.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

З обережністю застосовувати при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні.

Перед та після застосуванням супозиторіїв слід ретельно вимити руки.

Не рекомендується застосовувати супозиторії курсом більше 1 тижня.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю .

У період вагітності препарат можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Невідомо чи екскретується гліцерин у грудне молоко, тому цей лікарський засіб застосовується тоді, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не застосовують в педіатричній практиці.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують ректально по 1 супозиторію 1 раз на добу через 15 - 20 хв після сніданку.

Супозиторій вводять у пряму кишку і утримують там протягом не менше 5 хв, якщо випорожнення не відбудеться раніше. Залишки супозиторіїв виводяться із організму разом з каловими масами.

Лікування запорів не повинно перевищувати 7 днів.

Передозування.

Симптомами передозування є часті рідкі випорожнення. У разі передозування слід відмінити препарат.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, біль, нудота, блювання, шлунково-кишкова кровотеча.

При тривалому застосуванні спостерігалися подразнення і неприємні відчуття у прямій кишці; іноді – катаральний проктит.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не вивчалась.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C.

Упаковка. По 6 супозиторіїв у стрипі. По 1 або 2 стрипа в пачці з картону.

Категорія відпуску. Без рецепта.