

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**МАКМІРОР КОМПЛЕКС**  
(MACMIROR COMPLEX)

**Склад:**

*діючі речовини:* ніфуратель, ністатин;

1 капсула містить: ніфурателю 500 мг, ністатину 200 000 МО;

*допоміжні речовини:* диметикон (диметилполісилоксан АК 1000);

*склад оболонки:* желатин, натрію етилпарагідроксибензоат (Е 215), натрію пропілпарагідроксибензоат (Е 217), гліцерин, натрію гідроксид, титану діоксид (Е 171), заліза оксид жовтий (Е 172).

**Лікарська форма.** Капсули вагінальні м'які.

**Фармакотерапевтична група.**

Протимікробні та антисептичні засоби. Код АТС G01A X.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.** Комплексна терапія вульвовагінальних інфекцій, викликаних чутливими до препарату збудниками: бактеріями, трихомонадами, грибами роду *Candida*.

**Протипоказання.**

Відома індивідуальна підвищена чутливість до діючих речовин препарату або до компонентів препарату.

**Спосіб застосування та дози.**

По 1 вагінальній капсулі вводити щовечора перед сном.

Для досягнення максимального терапевтичного ефекту необхідно вводити капсулу у верхню частину вагіни.

Курс лікування – 8 днів.

**Побічні реакції.**

Дуже рідко можливі алергічні реакції у вигляді висипань на шкірі або свербіж.

**Передозування.**

Випадки передозування невідомі.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Не рекомендується застосовувати препарат у період вагітності. Під час лікування слід припинити годування груддю.

**Діти.**

Препарат не застосовують дітям.

**Особливості застосування.**

Застосування препарату, особливо протягом тривалого часу, може викликати реакції підвищеної чутливості.

Якщо виникають ознаки алергічної реакції, слід припинити застосування препарату.

Під час застосування препарату потрібно утримуватися від статевих стосунків.

Необхідно провести одночасне лікування статевого партнера, щоб уникнути повторного зараження.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Клінічно значуща взаємодія препарату з іншими лікарськими засобами не встановлена.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакокінетика.** У лікарському препараті МАКМІРОР КОМПЛЕКС поєднано діючі речовини ніфуратель і ністатин. Ніфуратель – це хімічна лікарська речовина, що синтезована науково-дослідною лабораторією POLI, здатна ефективно знищувати трихомонади, бактерії і грибові мікроорганізми.

Ністатин – це відомий антибіотик протигрибової дії, ефективний при лікуванні кандидомікозу.

Поєднання діючих речовин ніфурателю та ністатину викликає активну протидію негативному впливу грибкових мікроорганізмів, знищує трихомонади і бактерії, при цьому взаємодія двох активних речовин не має негативних наслідків.

Більш того, дві лікарські речовини доповнюють і підсилюють протигрибову дію одна одної.

**Фармакокінетика.** Складові речовини препарату не всмоктуються м'якими тканинами організму і не зумовлюють системної дії.

**Фармацевтичні характеристики.**

**Основні фізико-хімічні властивості:** м'які желатинові вагінальні капсули яйцеподібної форми гірчичного кольору, які містять маслянисту світло-жовту суспензію.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

При температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

8 вагінальних капсул в одному блістері, вміщених у картонну коробку.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробники.** Доппель Фармацевтіці С.р.л., Італія (відповідальний за випуск серії);

Каталент Італі С.п.А., Італія (виробник продукту in bulk).

**Місцезнаходження.** Віа Волтурно, 48 – Квінто Де'Стампі – 20089 Роццано (Мі) – Італія.

Віа Неттуненсе Км 20, 100 04011 Апрілія (ЛТ), Італія