

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГРИП-ГРАН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Aconitum 1000CH 20 мг; Rhus toxicodendron 1000CH 20 мг; Arnica 1000CH 20 мг; Arsenicum album 1000CH 20 мг; Mercurius solubilis 1000CH 20 мг;

допоміжна речовина: цукор кондитерський.

Лікарська форма. Гранули.

Гранули, розчинні у воді, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору.

Назва і місцезнаходження заявника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 76-78.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Послаблює симптоми загальної інтоксикації, гарячки. Підвищує стійкість організму до впливу несприятливих погодних факторів, сприяє активізації захисних сил організму.

Показання для застосування.

У комплексному лікуванні: профілактика та лікування грипу, гострих респіраторних захворювань.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При застосуванні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомами має становити не менше 30 хв.

Пацієнтам із рідкісною вродженою непереносимістю фруктози, синдромом мальабсорбції глюкози-галактози або дефіцитом сахарози-ізомальтази не слід застосовувати препарат. Препарат містить крупку цукрову, що слід враховувати пацієнтам з цукровим діабетом.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності та годування груддю.

Застосування препарату у період вагітності і годування груддю не досліджувалось.

Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, лікар вирішує індивідуально.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не призначають дітям віком до 1 року.

Спосіб застосування та дози. Під час хвороби дорослим та дітям віком від 7 років – по 7 гранул під язик 3-5 разів на день. Для профілактики під час епідемії – по 7 гранул 1-2 рази на день протягом 2-4 місяців. Дітям віком від 1 до 7 років – із розрахунку 1 гранула на рік життя (на 1 прийом).

Гранули приймати під язик, до повного розсмоктування, за 15-20 хв до або через 1 годину після їжі.

Дітям, за необхідності, гранули розчинити у невеликій кількості води.

Передозування.

У більшості випадків не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії, але у осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні ефекти. Можливі реакції гіперчутливості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Можливе сумісне застосування з будь-якими методами лікування і лікарськими засобами (у тому числі антибіотиками, протизапальними засобами, вітамінами). Інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.

Упаковка. По 10 г гранул у пеналі полімерному, в картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.