

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ТЕРЖИНАН**  
**(TERGYNAN®)**

**Склад:**

**діючі речовини:** 1 таблетка містить тернідазолу 200 мг; неоміцину сульфату 100 мг (65 000 МО); ністатину 100 000 МО; преднізолону натрію метасульфобензоату 4,7 мг, що відповідає 3,0 мг преднізолону.  
**допоміжні речовини:** крохмаль пшеничний, кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію крохмальгліколят (тип А), магнію стеарат, лактози моногідрат.

**Лікарська форма.** Таблетки вагінальні.

**Фармакотерапевтична група.**

Протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються у гінекології. Похідні імідазолу та кортикостероїди.  
Код АТС G01B F.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Лікування вагінітів, спричинених чутливими до препарату мікроорганізмами, у тому числі:  
– бактеріальні вагініти, спричинені банальною піогенною мікрофлорою;  
– неспецифічні вагініти, що супроводжуються десквамативними виділеннями;  
– трихомоніаз піхви;  
– вагініти, спричинені грибами роду *Candida*;  
– вагініти, спричинені змішаною інфекцією (трихомонадами, анаеробною інфекцією та дріжджоподібними грибами).

**Противоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Спосіб застосування та дози.**

Дози та тривалість лікування визначає лікар індивідуально.  
Вводити глибоко у піхву по 1-2 таблетки на добу. Середня тривалість курсу лікування – 10 діб, у випадках підтвердженого мікозу – 20 діб. Лікування не припиняють під час менструації. Перед введенням у піхву таблетку слід змочити водою протягом 20-30 с. Потрібно полежати приблизно 15 хв після введення препарату.

**Побічні реакції.**

Алергічні реакції на діючі речовини препарату, уключаючи кропив'янку, висипання на шкірі; реакцій у місці застосування, що можуть проявлятися наприклад печінням, болем, відчуттям свербіжжю, поколюванням або подразненням; ерозії; підвищена чутливість.

Системні ефекти: при місцевому застосуванні можлива незначна абсорбція компонентів препарату. При виникненні системних ефектів з боку кортикостероїдів можливе сповільнення загоєння ран і тріщин, атрофія слизової оболонки.

**Передозування.**

У зв'язку з незначною абсорбцією препарату в системний кровообіг передозування малоімовірно.  
При передозуванні можливе посилення проявів побічних реакцій. В такому випадку слід відмінити застосування препарату та звернутися до лікаря. Лікування: симптоматичне.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Застосування можливе за призначенням під контролем лікаря відповідно до показань до застосування препарату.

**Діти.**

Препарат не застосовують дітям.

**Особливості застосування.**

Потрібне одночасне лікування статевого партнера для запобігання загрози повторного зараження.  
Деякі вагінальні препарати з ністатином можуть пошкоджувати латексні контрацептиви.  
Зважаючи на можливу незначну абсорбцію преднізолону, слід прийняти до уваги, що при застосуванні системних кортикостероїдів необхідне спостереження з боку спеціалістів при остеопорозі, артеріальній гіпертензії або серцевій недостатності, при існуючих або наявних в анамнезі серйозних емоційних розладах, цукровому діабеті, туберкульозі, глаукомі, при міопатії, спричиненій застосуванням кортикостероїдів, печінкової недостатності, епілепсії, пептичній виразці, гіпотиреозі, нещодавно перенесеному інфаркті міокарда.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не впливає.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не виявлена.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакокінетика.**

Фармакологічні властивості зумовлені властивостями компонентів препарату.  
Тернідазол чинить трихомонацидну дію, також активний відносно анаеробних бактерій, у тому числі гарднерел.  
Неоміцину сульфат – антибіотик широкого спектра дії з групи аміноглікозидів.  
Ністатин – протигрибковий антибіотик з групи полієнів, активний відносно грибів роду *Candida*.  
Преднізолон – глюкокортикоїд, має виразу протизапальну дію.  
Склад ексципієнтів дозволяє забезпечити цілісність слизової оболонки вагіни та постійне рН.

**Фармакокінетика.**

Не вивчалася.

**Фармацевтичні характеристики.**

**Основні фізико-хімічні властивості** – продовгуваті таблетки кремового кольору, з літерою «Т».

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати у недоступному для дітей місці.  
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

**Упаковка.**

По 6 або по 10 таблеток у стрипі ; по 1 стрипу у картонній коробці з маркуванням українською мовою.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробник.**

**Місцезнаходження.**

21, вул. Прессуар, 28500, Вернуїє, Франція/ 21 rue du Pressoir, 28500 Vernouillet, France.

**Власник реєстраційного посвідчення.**

Лабораторії Бушара Рекордаті, Франція/ Laboratoires Bouchara Recordati, France.