

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування лікарського засобу

**ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ**  
**(WATERFORINJECTIONS)**

**Склад:**

*діюча речовина* : вода для ін'єкцій;  
1 ампула містить води для ін'єкцій 2мл або 5 мл.

**Лікарська форма.** Розчинник для парентерального застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора безбарвна рідина.

**Фармакотерапевтична група** Розчинники та засоби розведення. Код АТХ V07A B.

**Фармакологічні властивості.** Вода для ін'єкцій апірогенна, хімічно не активна, не має фармакологічної дії.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.** Воду для ін'єкцій застосовувати для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом'язового, внутрішньовенного введення.

**Протипоказання.** Воду для ін'єкцій як розчинник лікарських і діагностичних препаратів не застосовувати, якщо в інструкції для медичного застосування препарату зазначений інший розчинник. Не застосовувати препарат для промивання очей при офтальмологічних операціях.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Вода для ін'єкцій не проявляє фармакологічної або хімічної взаємодії з лікарськими та діагностичними засобами, призначеними для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення.

**Особливості застосування.** Вода для ін'єкцій призначена лише для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення, у способі застосування яких передбачене застосування води для ін'єкцій. Воду для ін'єкцій не можна безпосередньо ввести внутрішньосудинно через низький осмотичний тиск у зв'язку з ризиком виникнення гемолізу!

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Можливо застосовувати у період вагітності або годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.** Приготування розчинів лікарських та діагностичних засобів з використанням води для ін'єкцій здійснюється в асептичних умовах (відкриття ампул, наповнення водою шприца та ємностей з лікарськими засобами). Кількість води для ін'єкцій з метою приготування розчину лікарського засобу визначається інструкцією для медичного застосування останнього.

**Діти.** Можливо застосовувати у педіатричній практиці.

**Передозування.** Не описано.

**Побічні реакції.** Не описані.

**Термін придатності.** 4 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 2 мл в ампулі, по 10 ампул у блістері, по 1 блістеру в пачці;  
по 5 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери в пачці

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** ПАТ «Галичфарм».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 79024, м Львів, вул. Опришківська, 6/8.