

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
№ _____
Ресетраційне посвідчення
№ _____

Отформатировано: не выделение цветом

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЕНГИСТОЛ
(ENGYSTOL[®])

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 таблетка містить: Sulfur D4 – 37,5 мг, Sulfur D10 – 37,5 мг, Vincetoxicum hircundinaria D6 – 75 мг, Vincetoxicum hircundinaria D10 – 75 мг, Vincetoxicum hircundinaria D30 – 75 мг;

допоміжні речовини: магнію стеарат, лактоза моногідрат.

Лікарська форма. Таблетки.

Круглі, плоскі з фаскою, від білого до жовто-білого кольору, без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Показання для застосування.

У комплексному лікуванні грипу та інших вірусних захворювань.

Отформатировано: Цвет шрифта: Авто

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.

Якщо симптоми не зникають чи стан пацієнта погіршується, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Токсичність у період вагітності та годування груддю гомеопатично розведених речовин, що входять до складу даного лікарського засобу, не встановлена.

Про жодні небажані реакції не повідомлялося.

Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар індивідуально, з урахуванням користі/ризиків.

Отформатировано: Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: Цвет шрифта: Авто

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з

Отформатировано: Цвет шрифта: Авто

іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат рекомендований для застосування дітям від народження.

Отформатовано: Цвет шрифта: Авто

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим та дітям віком від 12 років – 1 таблетка під язик (до повного розсмоктування), дітям віком до 12 років – 1 таблетку розтерти в порошок і, ретельно перемішуючи, розчинити у 20 мл (4 чайних ложки) кип'яченої води кімнатної температури та приймати разову вікову дозу: дітям віком до 1 року – 1 чайна ложка, дітям віком від 1 до 6 років – 2 чайних ложки, дітям віком від 6 до 12 років – 3 чайних ложки. Разову вікову дозу приймати 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через годину після їди. У разі гострого початку захворювання приймати разову вікову дозу кожні 15 хвилин протягом перших 2 годин. Далі перейти на прийом 3 рази на добу. З метою профілактики грипу, ГРВІ приймати разову вікову дозу 1-2 рази на добу.
Курс лікування – 2-4 тижні.

Отформатовано: Цвет шрифта: Авто

Передозування.

Не відзначалося.

Побічні ефекти.

В окремих випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк. Якщо виникли такі реакції, необхідно тимчасово припинити застосування препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Сумісний з іншими лікарськими засобами.

Отформатовано: Цвет шрифта: Авто

Термін придатності.

5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Поліпропіленовий контейнер на 50 таблеток у картонній коробці.

Отформатовано: Цвет шрифта: Авто

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Отформатовано: Цвет шрифта: Авто

Отформатовано: Цвет шрифта: Авто