

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АДЕНОМА-ГРАН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Conium 1000CH 20 мг, Sabal serrulatum 50CH 20 мг, Thuja 1000CH 20 мг, Calcium fluoratum 200CH 20 мг, Pulsatilla 1000CH 20 мг;
допоміжна речовина: цукор кондитерський.

Лікарська форма. Гранули.

Гранули, розчинні у воді, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору.

Назва і місцезнаходження заявника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».
Україна, 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 76-78.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».
Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. М. Грушевського, 19.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.

Усуває дизуричні явища, поліпшує виділення сечі. Сприяє нормалізації рівня загальних естрогенів і підтриманню статевої функції. Перешкоджає росту аденоми.

Показання для застосування.

У складі комплексного лікування аденоми передміхурової залози I-II ступеня.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При одночасному застосуванні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомами має становити не менше 30 хв.

Пацієнтам із рідкісною вродженою непереносимістю фруктози, синдромом мальабсорбції глюкози-галактози або дефіцитом сахарази-ізомальтази не слід застосовувати препарат. Препарат містить крупку цукрову, що слід враховувати пацієнтам з цукровим діабетом.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат не застосовують у жінок.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не призначати дітям.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим приймати по 5 гранул під язик 1 раз на добу протягом 2-2,5 місяця, бажано в один і той же час. Для досягнення стійкого результату необхідно повторити курс лікування з інтервалом 2 тижні.

Гранули приймати під язик, до повного розсмоктування, за 15-20 хвилин до або через 1 годину після їди.

За необхідності гранули можна розчинити у невеликій кількості води.

Передозування.

Прийом препарату у великій кількості у більшості випадків не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії, але у осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні ефекти. Можливі реакції гіперчутливості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Можливе поєднання прийому препарату з будь-якими методами лікування і лікарськими засобами (у тому числі антибіотиками, протизапальними засобами, вітамінами). Інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 10 г гранул у пеналі полімерному, у картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.