

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

АРТРО-ГРАН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Rhus toxicodendron 1000CH 20 мг, Bryonia alba 200CH 20 мг, Causticum 1000CH 20 мг, Ledum 200CH 20 мг, Rhododendron 50CH 20 мг;
допоміжна речовина: цукор кондитерський.

Лікарська форма. Гранули.

Гранули, розчинні у воді, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору.

Назва і місцезнаходження заявника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».
Україна, 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 76-78.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».
Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Полегшує біль, набряклість, скутість рухів у суглобах, сприяє нормалізації мінерального обміну, поліпшує кровопостачання тканин.

Показання для застосування.

У комплексному лікуванні: біль у суглобах, артрити, артрози, ревматоїдний поліартрит, подагра. Розтягнення м'язів і зв'язок. Корінцеві болі, попереково-крижовий радикуліт.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При одночасному застосуванні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомами має становити не менше 30 хв.

Пацієнтам із рідкісною вродженою непереносимістю фруктози, синдромом мальабсорбції глюкози-галактози або дефіцитом сахарази-ізомальтази не слід застосовувати препарат. Препарат містить крупку цукрову, що слід враховувати пацієнтам з цукровим діабетом.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату у період вагітності і годування груддю не досліджувалось.

Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, лікар вирішує індивідуально.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не призначають дітям віком до 3 років.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям від 12 років – по 5 гранул під язик до повного розсмоктування; дітям від 3 до 12 років – по 3 гранули на 1 прийом, розчинені в невеликій кількості води або під язик. Гранули слід приймати за 15-20 хвилин до або через 1 годину після їди.

Приймати 1-3 рази на добу, залежно від інтенсивності больового синдрому.
При зменшенні болю препарат приймати 2-3 рази на тиждень. Курс лікування – 3-4 місяці.
За необхідності курс повторити через 2-3 тижні.

Передозування.

У більшості випадків не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії, але у осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні ефекти. Можливі реакції гіперчутливості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Можливе сумісне застосування з будь-якими методами лікування і лікарськими засобами (у тому числі антибіотиками, протизапальними засобами, вітамінами). Інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 10 г гранул у пеналі полімерному, у картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.