

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

ІНЦЕНА[□]

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 100 мл містить: Capsicum D2 1 мл, Belladonna D6 10 мл, Pulsatilla D6 10 мл, Apis D12 10 мл, Lachesis D12 10 мл;
допоміжні речовини: етанол 43 % (м/м).
1 мл розчину містить 25 крапель.

Лікарська форма.

Краплі оральні.
Прозора від безбарвного до ледь жовтуватого кольору рідина без специфічного запаху.

Назва і місцезнаходження виробника.

Ріхард Бітнер АГ,
Оссіахерштрассе 7, А-9560 Фельдкірхен, Австрія.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат.

ІНЦЕНА[□] чинить системну дію, зумовлену поєднанням та взаємним підсиленням активних компонентів. Чинить протизапальну, знеболювальну, десенситілізуючу, імуномодулюючу та репаративну дію. Пригнічує синтез медіаторів запалення та уповільнює накопичування макрофагів, лейкоцитів у вогнищі запалення. Зменшує проникність капілярів та перешкоджає утворенню набряків. Покращує реологічні властивості крові за рахунок зменшення агрегації тромбоцитів. Скорочує всі фази розвитку та ступінь вираженості запалення. Не чинить мінералокортикоїдної дії.

У хворих хірургічного профілю прискорює очищення ранової поверхні від гнійних виділень та стимулює процеси загоєння. Покращує показники функції нирок при супутній хронічній нирковій недостатності на тлі вторинного амілоїдозу.

У хворих на ревматоїдний артрит включення препарату в базисне лікування забезпечує швидке досягнення знеболювального та протизапального ефектів, а також дає можливість зменшити дозу або взагалі відмовитися від застосування синтетичних нестероїдних протизапальних препаратів. Препарат достовірно покращує загальний стан хворих та працездатність, скорочує тривалість ранкової скруті, зменшує інтенсивність больового синдрому та ступеня набрякості уражених суглобів, сприяє нормалізації лабораторних показників (насамперед ШОЕ), суттєво покращує показники якості життя пацієнтів, які хворіють на запальні та дегенеративні захворювання опорно-рухового апарату.

Показання для застосування. Гострі та хронічні запальні або дегенеративні захворювання опорно-рухового апарату та м'яких тканин, що супроводжуються больовим синдромом: артрити, остеоартрити, поліартрити, артрози, остеохондроз, травми, рани, у т.ч. післяопераційні, з тенденцією до нагноєння. У складі комплексного лікування колагенозів (ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак), гломерулонефриту, ревматизму, дерматоміозиту.

Противпоказання. Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

На початку лікування можливе короткочасне незначне посилення симптомів захворювання, що свідчить про дію препарату та не потребує відміни або корекції дози препарату. Відсутність покращання упродовж 5-7 днів самостійного лікування свідчить про можливе неправильне застосування препарату. У такому випадку Вам треба обов'язково звернутися до Вашого лікаря за додатковою консультацією.

Оскільки Інцена[□] містить рослинні та інші природні компоненти, при зберіганні може спостерігатися незначна зміна смаку, прозорості або кольору розчину, що не призводить до зниження ефективності препарату.

Особливі застереження.

Інформація щодо будь-якого ризику від застосування препарату у період вагітності або годування груддю дотепер не зареєстрована. Препарат можна застосовувати у період вагітності або годування груддю у випадках, якщо, на думку лікаря, очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат не впливає на здатність керувати транспортними та механічними засобами.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 1 року.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі та діти віком від 12 років : по 10 крапель препарату у чистому вигляді або розведених в 1 столовій ложці води;

діти віком 5-12 років : по 5-7 крапель препарату, розведених в 1 столовій ложці води;

діти віком 1-4 роки: по 1-4 краплі препарату, розведених в 1 столовій ложці води.

Приймати тричі на добу.

На початку лікування та при загостренні захворювання з метою швидкого ослаблення симптомів можливий прийом препарату кожні півгодини-годину до 8 разів на добу до покращання стану, але не більше 3-х діб, з переходом на стандартний (триразовий) прийом препарату.

Для досягнення максимального ефекту препарат рекомендується приймати у проміжках між прийомами їжі (за 30 хв до або через 1 год після їди), потримавши препарат деякий час у роті перед проковтуванням.

Основний курс лікування становить 2-3 місяці. При стабілізації стану можливий перехід на підтримуючий прийом (2 рази на добу).

Передозування. Випадки передозування не виявлені.

Побічні ефекти. Не виявлені. У виняткових випадках в осіб із гіперчутливістю на будь-який компонент препарату можливе виникнення алергічних реакцій.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Клінічно значущої взаємодії з іншими фармакологічними засобами не встановлено. Препарат можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування.

При одночасному застосуванні препарату з нестероїдними протизапальними препаратами прийом або доза останніх може бути зменшена після консультації лікарем.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці у щільно закритому флаконі в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 30°C.

Упаковка.

По 20 мл або 50 мл, або 100 мл у флаконах-крапельницях із темного скла у картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.