

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**РИЦИНОВА ОЛІЯ**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* олія рицинова;  
1 флакон містить: олії рицинової 30 г або 100 г.

**Лікарська форма.**

Олія оральна.

Прозора, густа, в'язка, майже безбарвна або злегка жовтувата рідина зі слабким запахом.

**Назва і місце знаходження виробника.**

ПАТ "Фітофарм".  
Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

**Фармакотерапевтична група.**

Проносний засіб. Код АТСА06А В05.

При застосуванні внутрішньо гідролізується ліпазою у тонкому кишечнику з утворенням рицинолевої кислоти, яка спричиняє подразнення рецепторів кишечника та рефлекторно посилює його перистальтику. Проносний ефект настає звичайно через 5-6 годин. Препарат також спричиняє рефлекторне скорочення міометрія.

**Показання для застосування.**

Запори.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до препарату. Отруєння жиророзчинними речовинами (фосфором, бензолом, фенолом). Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, виразковий коліт. Отруєння жиророзчинними протигельмінтними засобами, екстрактом папороті чоловічої. Гострі запальні процеси в черевній порожнині (апендицит, перитоніт). Маткові кровотечі. Кахексія. Період вагітності. Літній вік. Дитячий вік до 12 років.  
Підвищена чутливість до рослин родини Молочайних (Euphorbiaceae), недиагностований біль у ділянці живота, обструкція жовчовивідних протоків, важка дегідратація.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Відсутні.  
*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити Вашому здоров'ю.*

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Застосування препарату протипоказане вагітним. У період годування груддю препарат застосовують лише в тому разі, коли очікувана користь для матері перевищує можливий ризик для дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Даних немає.

**Діти.**

Препарат застосовують дітям віком від 12 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовувати внутрішньо.  
Рекомендована доза для дорослих та дітей віком від 12 років – 15-30 г на прийом.  
Якщо препарат застосовувати для очищення кишечника перед діагностичними процедурами, то доцільно вжити його за 6 годин до проведення процедури.

**Передозування.**

Нудота, блювання, біль у животі, діарея. Лікування симптоматичне.

**Побічні ефекти.**

Нудота, блювання, діарея, біль у животі, порушення водно-електролітного балансу. Після спорожнення кишечника можливий запор. При тривалому застосуванні – порушення травлення, ентероколіт, розвиток звикання, атонія кишечника.

Можливі алергічні реакції.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не рекомендовано застосовувати Рицинову олію одночасно з екстрактом папороті чоловічої.

**Термін придатності.**

5 років.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці. При температурі не вище 25 °С.  
Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 30 г або по 100 г у флаконах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.