

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ВАЗЕЛІНОВЕ МАСЛО

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить вазелінове масло – 25 мл або 50 мл.

Лікарська форма. Масло.

Прозора, безбарвна, масляниста, нефлюоресцююча у денному світлі рідина.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Фітофарм».

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Проносні засоби. Код АТС А06А А01.

Вазелін – очищена суміш твердих та рідких вуглеводів, які одержують із нафти. При прийомі внутрішньо, не всмоктуючись, розм'якшує калові маси та сприяє їхньому просуванню кишечником. При зовнішньому застосуванні усуває сухість шкіри, практично не абсорбується у системний кровотік.

Показання для застосування.

Внутрішньо – хронічні запори у дорослих.

Зовнішньо – перед застосуванням банок, при сухості шкіри (у тому числі навколо природних отворів), перед проведенням медичних процедур (змащувати наконечник клізми, газовивідної трубки).

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату.

Не можна застосовувати внутрішньо при гострих запальних процесах органів черевної порожнини (апендицит, перитоніт, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, виразковий коліт), геморої, під час менструації.

Не застосовувати при отруєнні фосфором і фосфороорганічними сполуками. Не застосовувати внутрішньо одночасно з жиророзчинними антигельмінтними засобами (патамол, вермокс, медамін, авермол).

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Перед застосуванням збовтувати.

При необхідності після аплікації масло витерти ватним або марлевым тампоном і змити теплою водою з милом.

Після припинення курсу застосування внутрішньо масло вазелінове може певний час виділятися із заднього проходу та забруднювати білизну, тому рекомендується використовувати прокладки.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності протипоказане.

У період годування груддю застосовувати з урахуванням співвідношення користь для матері/ризик для дитини, яке визначає лікар.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Дані відсутні.

Діти.

Застосовувати дітям тільки зовнішньо.

Спосіб застосування та дози.

Призначати дорослим внутрішньо по 1-2 столові ложки 1 раз на добу. Тривалість застосування визначає лікар залежно від терапевтичного ефекту та переносимості препарату.

Зовнішньо дорослим і дітям – змащувати шкіру тонким шаром, легко втираючи.

Передозування.

Не описане. Можливе посилення побічних ефектів.

Побічні ефекти.

Тривале застосування може спричинити порушення процесу травлення, нудоту, анорексію, гіповітаміноз А, В, К, подразнення та свербіж у ділянці заднього проходу.

Можливі алергічні реакції, включаючи гіперемію, свербіж шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Посилює побічні ефекти жиророзчинних та антигельмінтних засобів.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл, по 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.