

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ГЛЮКОЗА
(GLUCOSE)

Склад:

діюча речовина: 1 таблетка містить глюкози моногідрату 1 г;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, тальк, кальцію стеарат, кислота стеаринова.

Лікарська форма. Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: таблетки круглої форми з плоскою поверхнею зі скошеними краями і рискою, білого кольору.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси. Код АТХ А16АХ.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Глюкоза бере участь в енергетичному та вуглеводному обміні, забезпечує поповнення енерговитрат, поліпшує антитоксичну функцію печінки, посилює скорочувальну діяльність серцевого м'яза та діурез.

Фармакокінетика.

Лікарський засіб добре всмоктується у травному тракті, з током крові розноситься в усі органи і тканини; продукти його обміну виводяться із сечею.

Клінічні характеристики.

Показання.

Гіпоглікемія. Поповнення легкозасвоюваних вуглеводів при фізичних і розумових навантаженнях.

Протипоказання.

Цукровий діабет і різні стани, що супроводжуються гіперглікемією. Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія невідома.

Особливості застосування.

Лікарський засіб не рекомендується призначати пацієнтам зі зниженою толерантністю до глюкози.

При тривалому застосуванні високих доз лікарського засобу необхідний контроль рівня цукру у крові.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Лікарський засіб можна застосовувати у період вагітності або годування груддю. Необхідно дотримуватися дозування та тривалості курсу відповідно до рекомендацій лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Лікарський засіб не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим і дітям віком від 3 років: приймати внутрішньо по 1/2-1 таблетці (0,5-1 г) на добу.
Дози та тривалість лікування залежать від характеру та перебігу захворювання, ефективності лікування.

Діти.

Даних щодо безпеки та ефективності застосування лікарського засобу дітям віком до 3 років немає, тому дану лікарську форму не слід застосовувати таким пацієнтам.

Передозування.

Симптоми: при одноразовому застосуванні великої кількості лікарського засобу спостерігається порушення травлення (нудота, здуття живота, діарея).

Лікування: відміна лікарського засобу. Симптоматична терапія.

Побічні реакції.

В осіб з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 таблеток у блістерах.

По 10 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПАТ «Київський вітамінний завод».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

04073, Україна, м. Київ, вул. Копилівська, 38.

Web-сайт: www.vitamin.com.ua.

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства

ГЛЮКОЗА
(GLUCOSE)

Состав:

действующее вещество: 1 таблетка содержит глюкозы моногидрата 1 г;

вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат, кислота стеариновая.

Лекарственная форма. Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с плоской поверхностью со скошенными краями и риской, белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы. Код АТХ А16АХ.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Глюкоза принимает участие в энергетическом и углеводном обмене, обеспечивает пополнение энергозатрат, улучшает антитоксическую функцию печени, увеличивает сократительную деятельность сердечной мышцы и диурез.

Фармакокинетика.

Лекарственное средство хорошо всасывается в пищеварительном тракте, с током крови разносится во все органы и ткани; продукты его обмена выводятся с мочой.

Клинические характеристики.

Показания.

Гипогликемия. Восполнение легкоусвояемых углеводов при физических и умственных нагрузках.

Противопоказания.

Сахарный диабет и различные состояния, сопровождающиеся гипергликемией. Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Взаимодействие неизвестно.

Особенности применения.

Лекарственное средство не рекомендуется назначать пациентам с пониженной толерантностью к глюкозе.

При длительном применении высоких доз лекарственного средства необходим контроль уровня сахара в крови.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Лекарственное средство можно применять в период беременности или кормления грудью. Необходимо соблюдать дозирование и длительность курса в соответствии с рекомендациями врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Лекарственное средство не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Способ применения и дозы.

Взрослым и детям в возрасте с 3 лет: принимать внутрь по 1/2-1 таблетке (0,5-1 г) в сутки.

Дозы и длительность лечения зависят от характера и течения заболевания, эффективности терапии.

Дети.

Данных относительно безопасности и эффективности применения лекарственного средства детям до 3 лет нет, поэтому данную лекарственную форму не следует применять таким пациентам.

Передозировка.

Симптомы: при одноразовом применении большого количества лекарственного средства наблюдается нарушение пищеварения (тошнота, вздутие живота, диарея).

Лечение: отмена лекарственного средства. Симптоматическая терапия.

Побочные реакции.

У лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции.

Срок годности. 4 года.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 10 таблеток в блистерах.

По 10 таблеток в блистере; по 3 или 5 блистеров в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ПАО «Киевский витаминный завод».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

04073, Украина, г. Киев, ул. Копыловская, 38.

Web-сайт: www.vitamin.com.ua.