

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ПАНТЕСТИН-ДАРНИЦЯ®
(PANTHESITIN-DARNITSA)

Склад:

діючі речовини: dexpanthenol, myramistin ;

1 г гелю містить декспантенолу (D-пантенолу) 50 мг, мірамістину 5 мг;

допоміжні речовини: пропіленгліколь, поліетиленгліколь (макрогол 400), полоксамер, спирт цетиловий, спирт стеариловий, вода очищена.

Лікарська форма. Гель.

Основні фізико-хімічні властивості: однорідний гель білого кольору зі слабким специфічним запахом.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, що сприяють загоєнню (рубцюванню) ран. Код АТХ D03A X.

Фармакологічні властивості.

Фармакокінетика.

Активна речовина препарату Пантестин-Дарниця ® декспантенол є провітаміном. При нанесенні на шкіру декспантенол проникає у клітини епітелію і трансформується у пантотенову кислоту, яка є складовою частиною кофериенту А, що бере участь у процесах синтезу пластичного матеріалу. Це призводить до посилення процесів формування і регенерації шкіри, ран, що важко загоюються, ускладнених ран.

Оскільки рани, які важко загоюються, як правило, ускладнені рановою інфекцією, з метою профілактики та лікування ранової інфекції у препарат уведений катіонний антисептик – мірамістин, антимікробна дія якого доповнює ефект декспантенолу.

Фармакокінетика.

Декспантенол метаболізується у тканинах на місці нанесення. Практично не проникає у системний кровотік.

Мірамістин завдяки властивостям полімерних речовин мазевої основи утримується у рановій поверхні і не всмоктується у системний кровотік.

Клінічні характеристики.

Показання.

- *Хірургія:* лікування ран різної локалізації і генезу, у тому числі післяопераційних ран, трофічних виразок і пролежнів у фазі регенерації (II фаза ранового процесу).
- *Комбустіологія:* лікування гранулюючих опікових ран, підготовка їх до аутодермопластики, поліпшення приживлення шкірних трансплантантів після пластичних операцій, лікування сонячних опіків.
- *Радіаційна медицина:* профілактика променевих ушкоджень слизових оболонок, шкіри та навколишніх тканин, лікування променевих виразок у фазі регенерації.
- *Стоматологія:* лікування хвороб пародонта (катаральний, виразково-некротичний гінгівіт, локалізований пародонтит, генералізований пародонтит), лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота (стоматит, хронічний рецидивуючий афтозний стоматит), травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота (протезний стоматит).
- *Педіатрія:* попірлості і пелюшковий дерматит, профілактика їхнього інфікування.
- *Гінекологія:* лікування ерозій шийки матки, ерозивних кольпітів та пошкоджень слизової оболонки піхви.
- Лікування інфекцій шкіри, зокрема, вторинно інфікованих екзем та нейродермітів.
- Лікування діабічних саден, порізів, подрипин, опіків та профілактика їхнього інфікування при побутовому травматизмі.

Противопоказання.

Підвищена чутливість до діючих речовин або до інших компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні препарату з іншими лікарськими засобами можливі:

з *аніонактивними речовинами (мильними розчинами)* – інактивація протимікробної дії мірамістину. Слід уникати одночасного застосування;

з *системними або місцевими антибіотиками* – зниження резистентності мікроорганізмів до антибіотиків;

з *деполяризуючими міорелаксантами (суксаметонію хлорид, декаметонію бромід)* – посилення ефективності останніх;

з *недеполяризуючими міорелаксантами* – послаблення ефективності останніх.

Препарат не можна застосовувати разом з іншими антисептиками, що інактивують антимікробну дію мірамістину.

Особливості застосування.

Слід уникати потрапляння гелю в очі.

Препарат не рекомендується застосовувати у I фазі ранового процесу при вираженій гнійній ексудації.

Препарат не слід застосовувати з іншими лікарськими засобами без попередньої консультації з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат застосовувати у період вагітності або годування груддю за призначенням лікаря, але слід уникати його застосування на великих ділянках.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовувати місцево. Після стандартної обробки ранової поверхні гель наносити тонким шаром на рану, потім накласти стерильну марлеву пов'язку. У разі необхідності препарат можна наносити на перев'язувальний матеріал, а потім на рану.

При наявності ексудату перед застосуванням препарату рану слід промити розчином фурациліну (1:5000) чи перекису водню (3 %) і висушити марлевою серветкою.

При *дерматологічних захворюваннях (ерозіях шийки матки, ерозивних кольпітих):* гель можна наносити безпосередньо на уражену поверхню 2-3 рази на добу.

При *гінекологічних захворюваннях (ерозії шийки матки, ерозивні кольпітих):* тампони, просочені препаратом, можна вводити глибоко у піхву у положенні лежачи.

При *стоматологічних захворюваннях:* препарат можна застосовувати тільки дорослим місцево у порожнині рота. Після індивідуальної гігієни ополоснути порожнину рота, наносити гель тонким шаром на поверхню ясень або ділянку ураження слизової оболонки порожнини рота. Протягом години не пити та не вживати їжу. При лікуванні травматичних уражень слизової оболонки порожнини рота (протезний стоматит) після нанесення гелю на ділянку ураження можна використовувати зубні протези. Препарат застосовувати 2-3 рази на добу. Тривалість лікування – 7-10 днів, до повного загоєння ураження або зменшення запальних процесів.

Діти.

Препарат можна застосовувати в педіатричній практиці (при появі клінічних ознак пошкоджень шкіри – з перших днів життя). Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально. Дітям віком до 1 року

препарат застосовувати при кожній зміні пелюшок (підгузника) до зникнення клінічних ознак пошкоджень шкіри.

Передозування.

При місцевому застосуванні передозування малоімовірно, оскільки активні компоненти препарату практично не потрапляють у системний кровотік.

У разі випадкового внутрішнього застосування препарату виникнення токсичних ефектів не очікується. При виникненні шлунково-кишкових розладів – симптоматична терапія.

Побічні реакції

З боку імунної системи: у разі індивідуальної непереносимості препарату можливі реакції гіперчутливості, що, зазвичай, проявляються змінами з боку шкіри. Це супроводжується появою відчуття свербіжу, гіперемії, локальних чи генералізованих висипань, різних за клінічними проявами та ступенем тяжкості. В окремих випадках можливе місцеве подразнення шкіри, що супроводжується відчуттям печіння, що зникає самостійно через 15-20 секунд і не потребує відміни препарату.

З боку шкіри та підшкірної клітковини: контактний дерматит, алергічний дерматит, еритема, екзема, кропив'янка, подразнення шкіри, набряк шкіри, пухирці, сухість шкіри, мокнуття.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Заморожування препарату не допускається.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 15 г або 30 г у тубі; по 1 тубі у паці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.