

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

МЕТЕОСПАЗМІЛ

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 капсула містить альверину цитрату 60 мг; симетикону 300 мг;
допоміжні речовини: желатин, гліцерин, титану діоксид (Е 171) .

Лікарська форма. Капсули.

Непрозорі м'які продовгуваті капсули блідо-жовтого кольору, розміру № 6.
Вміст капсули: густа білувата суспензія.

Назва і місцезнаходження виробника.

Виробництво нерозфасованої продукції:
ЛЖВ КАПСЮЛЬ.

20 рю Луї-Шарль Верн ін 77190 ДАММАРІ-ЛЕ-ЛІ С, Франція.

Виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості, відповідальний за випуск серії:

Лабораторії Майолі Спіндлер.

6, Авеню де л'Европ 78400 Шату Франція.

Фармакотерапевтична група. Препарати для лікування функціональних розладів шлунково-кишкового тракту. Альверин, комбінації.

Код АТС А03АХ58.

Альверин – міотропний спазмолітик, дія якого не супроводжується атропіноподібним ефектом. Знижує підвищений тонус гладкої мускулатури кишечника. Альверин діє на мускулатуру шлунково-кишкового тракту на клітинному рівні, блокуючи кальцієві канали в гладких м'язових клітинах кишечника, а також блокує нейрорецептори рецептор-залежних каналів, і таким чином знімає м'язовий спазм.

Симетикон – гідрофобна полімерна сполука з низьким поверхневим натягом, знижує газоутворення у кишечнику та покриває захисною плівкою стінки шлунково-кишкового тракту.

Показання для застосування.

Симптоматичне лікування функціональних розладів кишечника, особливо тих, що проявляються метеоризмом.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до альверину або будь-якого іншого компонента препарату.

Кишкова непрохідність, в тому числі паралітична; обструктивні захворювання шлунково-кишкового тракту.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю .

Застосування препарату у період вагітності або годування груддю не рекомендовано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат може спричиняти запаморочення, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Діти. Препарат не застосовувати у педіатричній практиці.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати внутрішньо д орослим по 1 капсулі 2-3 рази на добу.

Приймати перед їдою.

Курс лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Випадків передозування не відмічено.

Побічні ефекти.

З боку нервової системи : головний біль, запаморочення.

З боку імунної системи: анафілактоїдні реакції включаючи кропив'янку, набряк гортані, задишку, чхання, шкірні висипання, свербіж, анафілактичний шок.

З боку печінки та жовчовивідних шляхів: жовтяниця внаслідок гепатиту, порушення функції печінки, які відновлюються після припинення лікування.

З боку шлунково-кишкового тракту: нудота.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не виявлена.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 капсул у блістері, по 2 або 3 блістери у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.