

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АРТІХОЛ
(ARTIHOL)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 таблетка містить артишоку сухого екстракту (*Synara scolymus*) 200 мг або 400 мг;

допоміжні речовини: магнію оксид важкий, кремнію діоксид колоїдний безводний, крохмаль кукурудзяний, тальк, магнію стеарат;*оболонка:* суміш для плівкового покриття Opadry 200 Brown (спирт полівініловий, тальк, титану діоксид (E 171), поліетиленгліколь, заліза оксид жовтий (E 172), заліза оксид червоний (E 172), заліза оксид чорний (E 172), метакрилатний сополімер (тип C), натрію гідрокарбонат).

Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою світло-коричневого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника .

ПАТ «Київський вітамінний завод».

04073, Україна, м. Київ, вул. Копилівська, 38.

Web-сайт: www.vitamin.com.ua.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів.

Код АТХ А05 А Х.

Фармакологічні властивості обумовлені дією комплексу біологічно активних речовин, що входять до складу листя артишоку польового (*Synara scolymus*). Чинить жовчогінну, гепатопротекторну та сечогінну дію, також знижує вміст сечовини в крові. Інулін та інші складові, які містить артишок, покращують обмінні процеси в організмі.

Показання для застосування. Хронічний гепатит, цироз печінки, хронічний некалькульозний холецистит, дискінезія жовчних шляхів за гіпокінетичним типом, хронічний нефрит, хронічна ниркова недостатність.

Противоказання. Відома підвищена чутливість до артишоку та інших рослин родини складноцвітих, непрохідність жовчовивідних та сечовивідних шляхів, жовчокам'яна хвороба, тяжка печінкова недостатність.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Препарат застосовують з обережністю при захворюваннях, що можуть призвести до непрохідності жовчовивідних шляхів та при тяжких захворюваннях печінки. Якщо симптоми захворювання не зникають або постійно рецидивують або у випадку виникнення діареї, болю в животі лікування препаратом слід припинити та проконсультуватися з лікарем. Препарат не застосовувати при гострих захворюваннях нирок.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або годування груддю препарат застосовують тільки за призначенням лікаря, якщо очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Дітям віком до 6 років препарат не застосовують.

Спосіб застосування та дози. Внутрішньо дорослим і дітям старше 12 років призначають по 200–400 мг 3 рази на добу перед їдою.

Дітям віком від 6 до 12 років призначають по 200 мг 3 рази на добу .

Курс лікування – 2-3 тижні. При необхідності можливе проведення повторних курсів за узгодженням з лікарем.

Передозування. Можливе посилення побічних ефектів

Лікування. Відміна препарату. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти. У разі тривалого застосування препарату у високих дозах можливі діарея, біль у верхній частині живота, нудота та печія, алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Терапевтичний ефект антикоагулянтів кумаринового типу (наприклад, фенпрокумону, варфарину)

може послаблятися, що потребує корекції дози цих препаратів.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

200 мг : По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці.

400 мг : По 10 таблеток у блістері; по 4 блістери у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.