

# ІНСТРУКЦІЯ

## для медичного застосування препарату

### АМІАК

#### **Склад:**

*діюча речовина:* аміаку розчин концентрований 44 мл;

*допоміжна речовина:* вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, дуже лужна рідина з різким запахом

#### **Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що впливають на респіраторну систему. Код АТХR07AB.

#### **Фармакологічні властивості**

##### *Фармакодинаміка.*

Аміаку розчин належить до лікарських засобів, які подразнюють нервові закінчення. Механізм дії аміаку при вдиханні полягає у рефлекторному збудженні дихального центру через рецептори верхніх дихальних шляхів – закінчення трійчастого нерва.

При нанесенні на шкіру чинить подразнювальну та антимікробну дію.

##### *Фармакокінетика.*

Препарат не надходить до кров'яного руслу.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Непритомний стан, при укусах комах.

##### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до лікарського засобу.

##### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не встановлена.

##### **Особливості застосування.**

Місцеве застосування можливе лише на неушкоджену шкіру.

При випадковому ураженні слизової оболонки ока промивати водою декілька разів (протягом 15 хв з перервою 10 хв) або 3 % розчином борної кислоти. Олії і мазі не застосовують. При ураженні носа і глотки застосовують 0,5 % розчин лимонної кислоти або натуральні соки. У разі прийому внутрішньо – пити воду, фруктовий сік, молоко, краще – 0,5 % розчин лимонної кислоти або 1 % розчин оцтової кислоти до повної нейтралізації вмісту шлунка.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

##### **Застосування у період вагітності або годування груддю.**

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не впливає.

##### **Спосіб застосування й дози.**

Для збудження дихального центру як засіб швидкої допомоги: невеликий шматочок марлі або вати, змочений розчином аміаку, обережно підносять до носових отворів на 0,5 – 1 с.

При укусах комах розчин аміаку застосовують зовнішньо у вигляді примочок (тривалість процедури – до 30 секунд).

*Діти.*

Препарат не застосовують дітям до 3 років.

**Передозування.**

Посилення проявів побічних реакцій.

Терапія симптоматична.

**Побічні реакції.**

При вдиханні парів розчину аміаку може виникнути рефлекторна зупинка дихання. При місцевому застосуванні можливі подразнення, дерматити, екзема у місці аплікації, алергічні реакції.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.*

**Термін придатності.** 3 роки.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 40 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

ТОВ «ДКП Фармацевтична фабрика»

**Місцезнаходження виробника.**

Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.

**ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування препарату**

**АМІАК**

**Склад:**

*діюча речовина:* аміаку розчин концентрований 44 мл;

*допоміжна речовина:* вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, дуже лужна рідина з різким запахом.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що впливають на респіраторну систему. Код АТХR07A B.

**Фармакологічні властивості**

*Фармакодинаміка.*

Аміаку розчин належить до лікарських засобів, які подразнюють нервові закінчення. Механізм дії аміаку при вдиханні полягає у рефлекторному збудженні дихального центру через рецептори верхніх дихальних шляхів – закінчення трийчастого нерва.

При нанесенні на шкіру чинить подразнювальну та антимікробну дію.

*Фармакокінетика.*

Препарат не надходить до кров'яного руслу.

### **Клінічні характеристики.**

#### ***Показання.***

Непритомний стан, при укусах комах.

#### ***Протипоказання.***

Підвищена чутливість до лікарського засобу.

#### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Не встановлена.

#### ***Особливості застосування.***

Місцеве застосування можливе лише на неушкоджену шкіру.

При випадковому ураженні слизової оболонки ока промивати водою декілька разів (протягом 15 хв з перервою 10 хв) або 3 % розчином борної кислоти. Олії і мазі не застосовують. При ураженні носа і глотки застосовують 0,5 % розчин лимонної кислоти або натуральні соки. У разі прийому внутрішньо – пити воду, фруктовий сік, молоко, краще – 0,5 % розчин лимонної кислоти або 1 % розчин оцтової кислоти до повної нейтралізації вмісту шлунка.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

#### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

#### ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.***

Не впливає.

#### ***Спосіб застосування й дози.***

Для збудження дихального центру як засіб швидкої допомоги: невеликий шматочок марлі або вати, змочений розчином аміаку, обережно підносять до носових отворів на 0,5 – 1 с.

При укусах комах розчин аміаку застосовують зовнішньо у вигляді примочок (тривалість процедури – до 30 секунд).

#### ***Діти.***

Препарат не застосовують дітям до 3 років.

#### ***Передозування.***

Посилення проявів побічних реакцій.

Терапія симптоматична.

#### ***Побічні реакції.***

При вдиханні парів розчину аміаку може виникнути рефлекторна зупинка дихання. При місцевому застосуванні можливі подразнення, дерматити, екзема у місці аплікації, алергічні реакції.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.*

#### ***Термін придатності.*** 3 роки.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 40 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

ТОВ «ДКП Фармацевтична фабрика»

**Місцезнаходження виробника.**

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.