

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

НУКС ВОМІКА-ГОМАКОРД
(NUX VOMICA - HOMACCORD®)

Склад:

діючі речовини: 100 г препарату містять: Bryonia D30 – 0,2 г, Bryonia D200 – 0,2 г, Bryonia D1000 – 0,2 г, Bryonia D2 – 0,2 г, Bryonia D6 – 0,2 г, Bryonia D10 – 0,2 г, Bryonia D15 – 0,2 г, Citrullus colocynthis D3 – 0,3 г, Citrullus colocynthis D10 – 0,3 г, Citrullus colocynthis D30 – 0,3 г, Citrullus colocynthis D200 – 0,3 г, Lycopodium clavatum D10 – 0,3 г, Lycopodium clavatum D30 – 0,3 г, Lycopodium clavatum D200 – 0,3 г, Lycopodium clavatum D1000 – 0,3 г, Lycopodium clavatum D3 – 0,3 г, Strychnos nux-vomica D30 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D15 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D10 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D200 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D1000 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D2 – 0,2 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин із запахом етанолу.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Препарат чинить протизапальну, дезінтоксикаційну, спазмолітичну та жовчогінну дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного та мінерального походження, які входять до складу препарату.

Клінічні характеристики.

Показання. Функціональні порушення та запалення з боку шлунково-кишкового тракту, жовчного міхура та печінки, спастичний запор, хронічний гепатит, інтоксикаційне ураження печінки та токсикоз вагітних, синдром абстиненції (алкогольний, наркотичний), виразковий коліт, дивертикуліт, гастрит і дуоденіт (гострий та хронічний), виразка шлунка, дисбіоз кишечника, метеоризм.

Противоказання. Індивідуальна чутливість до будь-яких компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю .

Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар індивідуально.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами .

Невідома.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим та дітям від 6 років – по 10 крапель, дітям до 2 років – по 3 краплі, від 2 до 6 років – по 5 крапель 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через 1 годину після їди. Краплі розчинити в 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

У гострих випадках приймати разову дозу кожні 15 хвилин протягом перших двох годин.

Курс лікування – 2-5 тижнів.

Лікар може порекомендувати зменшити частоту прийому до 1-2 разів на добу та призначити повторний курс лікування через 2-3 тижні.

Діти.

Препарат рек омендований для застосування дітям від народження.

Передозування.

Не відзначалося.

Побічні реакції.

У поодиноких випадках гомеопатичне початкове загострення може призвести до тимчасового запаморочення та головного болю, що швидко проходить і не потребує відміни препарату. У осіб з підвищеною індивідуальною чутливістю до компонентів препарату можливі алергічні реакції.

Термін придатності. 5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

Умови зберігання.

Спеціальних умов зберігання не потребує.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності .

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.