

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**ОКСОЛІН**  
**(OXOLIN)**

**Склад:**

*діюча речовина:* оксолін;

1 г мазі містить оксоліну 2,5 мг;

*допоміжна речовина* : парафін м'який.

**Лікарська форма.** Мазь назальна.

**Основні фізико-хімічні властивості:** мазь від білого до світло-жовтого кольору. При зберіганні допускається поява рожевого відтінку.

**Фармакотерапевтична група.** Противірусні засоби. Код АТХ S01A D.

**Фармакологічні властивості .**

*Фармакодинаміка.*

Оксолін – противірусний засіб для зовнішнього застосування, має вірусцидну активність, блокуючи місця зв'язування вірусу грипу (здебільшого типу А2) з поверхнею клітинної мембрани, захищає клітини від проникнення в них вірусу. До дії оксоліну чутливі також віруси Herpes simplex, оперізувального герпесу, аденовіруси, віруси інфекційних бородавок та контагіозного молоска.

*Фармакокінетика.*

Препарат нетоксичний, при місцевому застосуванні системної дії не виявлено, в організмі не накопичується. При нанесенні на слизову оболонку всмоктується 20 %, виводиться здебільшого нирками протягом доби.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.** Профілактика грипу; лікування вірусного риніту.

**Противоказання.** Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Одночасне інтраназальне застосування з адреноміметичними засобами може призвести до пересушування слизової оболонки носа.

**Особливості застосування.**

Мазь не призначена для нанесення на слизову оболонку очей. Препарат не можна наносити на уражену шкіру.

**Застосування у період вагітності або годування груддю .** Дані щодо безпеки та ефективності застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутні. Препарат не бажано застосовувати у ці періоди.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Препарат не впливає на швидкість нервово-м'язової провідності, у рекомендованих дозах його можна застосовувати особам, які керують автотранспортом та працюють зі складними механізмами.

**Спосіб застосування та дози.** Для профілактики грипу – щоденно 2-3 рази на добу наносити на слизову оболонку носа протягом 25 днів або при контакті з хворими.

Лікування вірусного риніту: щоденно 2-3 рази на добу наносити на слизову оболонку носа протягом 3-4 днів.

**Діти.** Дані щодо безпеки та ефективності застосування препарату дітям відсутні.

**Передозування.** Випадки передозування невідомі. При передозуванні Оксоліну можливе виникнення подразнення шкіри та слизових оболонок у місці нанесення препарату та ринорея, відчуття печіння на слизовій оболонці носа.

Лікування: припинити застосування препарату, залишки мазі змити теплою водою.

**Побічні реакції.** У місці нанесення мазі може виникати відчуття печіння, яке швидко минає, посилення виділень з носа, забарвлення слизової оболонки у синій колір. Можливий розвиток реакцій гіперчутливості.

**Термін придатності.** 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати при температурі від +2° до +8 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** У тубі по 10 г.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

ВАТ «НИЖФАРМ», Російська Федерація.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

603950, м. Нижній Новгород, ГСП-459, вул. Салганська, 7.