

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування лікарського засобу

**ЕНТЕРОСГЕЛЬ ЕКСТРАКАПС**  
**(ENTEROSGELUM EXTRACAPS)**

**Склад:**

*діюча речовина:* ксерогель поліметилсилоксану;  
1 капсула містить ксерогелю поліметилсилоксану 0,32 г;  
*допоміжні речовини:* желатин, титану діоксид (Е 171).

**Лікарська форма.** Капсули для перорального застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* тверді желатинові капсули, корпус і кришечка білого кольору. Вміст капсул - порошок білого або майже білого кольору, без запаху.

**Фармакотерапевтична група.**

Ентеросорбенти. Код АТХ А07В С.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакокінетика.*

При внутрішньому застосуванні чинить детоксикаційну дію. Препарат ефективно адсорбує з вмісту кишечника та крові (через мембрани капілярів ворсинок слизової оболонки кишечника) середньомолекулярні токсичні речовини, продукти незавершеного метаболізму, сприяє виведенню інкорпорованих радіонуклідів. Ентеросгель ЕкстраКапс усуває прояви токсикозу, покращує функцію кишечника, печінки, нирок, нормалізує показники крові та сечі. Як ефективний детоксикант, Ентеросгель ЕкстраКапс сприяє підвищенню імунітету.

*Фармакокінетика.*

Препарат обволікає слизову оболонку шлунка та кишечника, захищає її від ерозивних процесів. Не всмоктується з кишечника.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

У складі комплексної дезінтоксикаційної терапії при хронічній нирковій недостатності, спричиненій пієлонефритом, полікістозом нирок, нефролітазом; при токсичному гепатиті, вірусному гепатиті А і В, гепатохолециститі, цирозі печінки та холестази різної етіології, гастритах зі зниженою кислотністю, ентероколітах, колітах, діареї; при отруєнні алкоголем і наркотичними засобами; алергічних реакціях, шкірних захворюваннях (діатези, нейродерміти); при опіковій інтоксикації; гнійно-септичних процесах, що супроводжуються інтоксикацією; токсикозах вагітних першої половини вагітності; в комплексній терапії дисбактеріозу кишечника.

**Протипоказання.**

Гостра кишкова непрохідність.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

За умови дотримання способу застосування (Ентеросгель ЕкстраКапс і медикаменти приймають окремо), препарат можна застосовувати в комплексній терапії з іншими лікарськими і профілактичними засобами, в тому числі з бактерійними препаратами (біфідум-, лактобактерії), фітопрепаратами, адаптогенами, імуномодуляторами. Не рекомендується одночасний прийом з препаратами, що відносяться до класу секвестрантів жовчних кислот, наприклад холестираміном, унаслідок посилення імовірності розвитку запорів.

Препарат не слід застосовувати разом з препаратами срібла.

**Особливості застосування.**

Приймати препарат слід згідно з рекомендаціями, викладеними в даній інструкції.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Препарат застосовують у період вагітності або годування груддю. Слід обмежити застосування вагітним, які мають схильність до запорів.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовують внутрішньо по 1-2 капсули 2-3 рази на добу за 1,5-2 години до або через 2 години після їжі або прийому медикаментів, запиваючи достатньою кількістю води.

Для дорослих та дітей віком від 14 років разова доза препарату становить 1-2 капсули, добова – 6 капсул.

Для дітей віком від 6 до 14 років разова доза – 1 капсула, добова – 3 капсули.

Курс лікування – від 7 до 14 днів.

При тяжких формах захворювань протягом перших 3 днів застосовують подвійну разову дозу, а при хронічному перебігу хвороби (хронічна ниркова недостатність, цироз печінки) можливе більш тривале застосування препарату.

**Діти.**

Препарат можна застосовувати дітям віком від 6 років. Для полегшення проковтування перед застосуванням можна попередньо розкрити капсулу (разова доза) та змішати її з невеликою кількістю рідини.

**Передозування.**

Перевищення максимальних разових доз не спричиняє побічних реакцій.

**Побічні реакції.**

При перших прийомах препарату можливий короточасний запор. Для його запобігання людям, схильним до запору, в перші два дні застосування препарату рекомендується очищувальна клізма на ніч або прийом послаблювальних засобів (лактолоза, пікосульфат натрію).

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 7 капсул у блістері. По 2 або 4 блістера вкладають у коробку з картоном.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

03680, Україна, м. Київ, вул. Радищева, 3.

**Заявник.**

ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ».

**Місцезнаходження заявника та його адреса місця провадження діяльності.**

03680, Україна, м. Київ, вул. Радищева, 3.