

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

СОЛДАГО КОМПОЗИТУМ С
(SOLIDAGO COMPOSITUM S)

Склад:

діючі речовини: 2,2 мл розчину містять: Solidago virgaurea D3 – 22 мг, Berberis vulgaris D4 – 22 мг, Vesica urinaria suis D8 – 22 мг, Pyelon suis D10 – 22 мг, Ureter suis D10 – 22 мг, Urethra suis D10 – 22 мг, Terebinthina larinica D6 – 22 мг, Hydrargyrum bichloratum D8 – 22 мг, Acidum arsenicosum D28 – 22 мг, Cuprum sulfuricum D6 – 22 мг, Barosma D8 – 22 мг, Hepar sulfuris D10 – 22 мг, Capsicum annuum D6 – 22 мг, Orthosiphon aristatus D6 – 22 мг, Equisetum hiemale D4 – 22 мг, Chondrodendron tomentosum D6 – 22 мг, Lytta vesicatoria D6 – 22 мг, Apisinum D8 – 22 мг, Baptisia tinctoria D4 – 22 мг, Natrium pyruvicum D10 – 22 мг, Pyrogenium-Nosode D198 – 22 мг, Smilax D6 – 22 мг, Colibacillinum-Nosode D13 – 22 мг, Coxsackie-Virus A 9-Nosode D8 – 22 мг, Argentum nitricum D6 – 22 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Клінічні характеристики.

Показання.

У комплексному лікуванні підгострих та хронічних захворювань нирок і сечовидільного тракту, таких як цистит, цистопієліт, сечокам'яна хвороба, гідронефроз; нічні енурези, дизурія при I стадії аденоми простати, звуження сечовивідного каналу; артеріальна гіпертензія при гострому гломерулонефриті; для стимуляції екскреторних функцій нирок, у т. ч. у випадку нпергїдрозів.

Противопоказання. Гіперчутливість до будь-якого компонента препарату.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років – 1 ампула по 2,2 мл. Застосовувати у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних, а при необхідності – внутрішньовенних ін'єкцій, дітям – у вигляді питних ампул (розчинити разову дозу у 5-10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті) 1-3 рази на тиждень.

Курс лікування – 4-6 тижнів.

Побічні реакції.

В окремих випадках, через індивідуальну чутливість до компонента препарату *Solidago virgaurea* (золотої розги) можливе підвищене слиновиділення. У такому випадку прийом препарату слід тимчасово припинити до зникнення проявів алергічної реакції. У поодиноких випадках можуть виникати реакції гіперчутливості (до анафілактичної реакції).

При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та негайно звернутися до лікаря.

Передозування. Не відзначалося.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує індивідуально лікар з урахуванням ризику/користі.

Діти. Препарат застосовують дітям віком від 6 років.

Особливості застосування.

При утримуванні симптомів чи погіршенні стану слід обов'язково проконсультуватися з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Невідома.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома. При застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем щодо можливості одночасного застосування.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Препарат чинить протизапальну, імуномодулюючу, репаративну, діуретичну, спазмолітичну, антисептичну дії. Дія препарату базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин без запаху.

Несумісність.

Препарат не слід змішувати з іншими лікарськими засобами в одній ємкості.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

5 (5x1), 10 (5x2) або 100 (5x20) ампул по 2,2 мл у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.