

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**ГЕПАРИН-ДАРНИЦЯ**  
**(HEPARIN-DARNITSA)**

**Склад:**

*діюча речовина:* heparin;  
1 г гелю містить гепарину натрію 600 МО;  
*допоміжні речовини:* карбомер, трометам ін, пропіленгліколь, спирт бензиловий, вода очищена.

**Лікарська форма.** Гель.

*Основні фізико-хімічні властивості:* однорідний, прозорий, безбарвний гель, зі слабким специфічним запахом.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби для застосування при варикозному розширенні вен. Гепарин. Код АТХ C05B A03.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Гепарин натрію є антикоагулянтною прямою дією; він блокує біосинтез тромбіну, гальмує утворення фібрину з фібриногену, зменшує агрегацію тромбоцитів і пригнічує активність гіалуронідази. При місцевому застосуванні гель Гепарин-Дарниця чинить антитромботичну, протизапальну і протинабрякову дію. Препарат не проявляє місцевоподразнювальної дії.

*Фармакокінетика.*

При нанесенні на шкіру в системний кровотік потрапляє незначна кількість гепарину натрію, яка виводиться в основному нирками.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Лікування захворювань поверхневих вен, таких як варикозне розширення вен і пов'язаних з ним ускладнень, флеботромбоз, тромбофлебіт, поверхневий перифлебіт. Післяопераційний варикозний флебіт, ускладнення після хірургічного видалення підшкірної вени ноги. Травми та забиті місця, інфільтрати та локалізовані набряки, підшкірні гематоми. Травми та розтягнення м'язово-сухожильних та капсуло-зв'язочних структур.

**Противопоказання.**

Індивідуальна підвищена чутливість до гепарину або будь-якого з компонентів препарату, трофічні виразки ніг, що кровоточать, та/або інфіковані рани, геморагічний діатез, пурпура, тромбоцитопенія, гемофілія, схильність до кровотечі.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

*Пероральні антикоагулянти* – одночасне застосування з гелем Гепарин-Дарниця може спричинити подовження протромбінового часу.

*Нестероїдні протизапальні лікарські засоби, венотонізуючі лікарські засоби* – при одночасному застосуванні підвищується ефект гелю Гепарин-Дарниця.

*Лікарські засоби для зовнішнього застосування (наприклад, препарати нестероїдних протизапальних засобів)* – при одночасному застосуванні з гелем Гепарин-Дарниця значно підвищується всмоктування інших лікарських засобів через шкіру.

Не слід застосовувати препарат разом із лікарськими засобами для місцевого застосування, наприклад, з *препаратами, що містять тетрациклін, гідрокортизон, саліцилову кислоту, з антикоагулянтами.*

**Особливості застосування.**

Гель Гепарин-Дарниця не слід наносити на відкриті рани і застосовувати при наявності гнійних процесів.

Не застосовувати на великих ділянках шкіри, на ділянках шкіри з підвищеною чутливістю, на слизові оболонки. Не можна допускати потрапляння гелю в очі.

Рекомендується проводити контроль показників згортання крові під наглядом лікаря.

У разі розладів згортання крові гель не рекомендується наносити на великі ділянки шкіри. Препарат не слід призначати при кровотечах.

Препарат слід застосовувати з обережністю при геморагічних процесах.

У разі лікування флебіту препарат не слід втирати в шкіру.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Не застосовувати препарат у період вагітності або годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Препарат Гепарин-Дарниця застосовувати місцево, 3- 10 см гелю наносити легкими втираючими рухами на шкіру ураженої ділянки 1-3 рази на добу. Доза препарату залежить від площі ураженої ділянки.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально, з урахуванням тяжкості перебігу захворювання.

**Діти.**

З огляду на обмежений досвід застосування препарат не слід призначати дітям

**Передозування.**

При місцевому застосуванні – малоімовірно. У зв'язку з відсутністю інформації про випадкове передозування або проковтування препарату не існує специфічних рекомендацій для даних станів.

*Лікування:* можуть бути використані загальні підтримуючі заходи.

Унаслідок випадкового перорального застосування гелю у дитини може виникнути нудота або блювання. У такому випадку потрібно промити шлунок, а при необхідності – призначити симптоматичну терапію. Дію гепарину можна нейтралізувати за допомогою протаміну сульфату.

**Побічні реакції**

*Дерматологічні порушення:* набряк шкіри, висипання на шкірі, свербіж, почервоніння, припухлість, відчуття печіння, крововиливи, іноді – виникнення невеликих пустул, пухирців або пухирів, що швидко минають після припинення застосування препарату.

*З боку імунної системи:* реакції гіперчутливості, включаючи кропив'янку, ангіоневротичний набряк.

При нанесенні на великі ділянки шкіри може бути розвиток системних побічних реакцій.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.