

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЕСКУЛЮС КОМПОЗИТУМ
(AESCULUS COMPOSITUM)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 г препарату містять: *Aesculus hippocastanum* D1 – 10 г, *Secale cornutum* D3 – 1 г, *Viscum album* D2 – 1 г, *Nicotiana tabacum* D10 – 1 г, *Solanum nigrum* D6 – 1 г, *Arnica montana* D3 – 1 г, *Echinacea* D2 – 1 г, *Baptisia tinctoria* D4 – 1 г, *Rhus toxicodendron* D4 – 1 г, *Cuprum metallicum* D13 – 1 г, *Ruta graveolens* D4 – 1 г, *Solanum dulcamara* D4 – 1 г, *Colchicum autumnale* D4 – 1 г, *Barium iodatum* D6 – 1 г, *Hamamelis virginiana* D4 – 1 г, *Apis mellifica* D4 – 1 г, *Acidum benzoicum e resina* D4 – 1 г, *Eupatorium cannabinum* D3 – 1 г, *Arteria suis* D10 – 1 г, *Natrium pyruvicum* D8 – 1 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Від прозорого до опалесцентного світло-жовтого кольору розчин із запахом етанолу.

Назва і місцезнаходження виробника.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат нормалізує стан венозного кровообігу та мікроциркуляцію. Дія препарату базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, що входять до складу препарату.

Показання для застосування.

У комплексному лікуванні порушень периферичного кровообігу: діабетична ангіопатія судин нижніх кінцівок II-III ступеня, варикозне розширення вен, у тому числі гемороїдальних вузлів, облітеруючий ендартеріїт нижніх кінцівок та їх гангренозний стан, постінсультні та постінфарктні стани, пролежні, дисциркуляторна енцефалопатія.

Противоказання.

Підвищена чутливість до рослин родини складноцвітих (у т.ч. *Arnica*, *Echinacea*), родини плюща отруйного, омели білої або до інших компонентів препарату. Туберкульоз, лейкемія, онкологічні захворювання, запальні захворювання сполучних тканин (колагенові хвороби, у т.ч. ревматизм, системний червоний вовчак), аутоімунні захворювання, розсіяний склероз, захворювання системи крові, СНІД, ВІЛ інфекція, імуносупресія або імунодефіцит різної етіології та інші хронічні вірусні захворювання.

Хронічні гранулематозні захворювання та аутоімуннопатії, гіпертиреоз із незбалансованим метаболічним порушенням. Гострі запальні та гарячкові стани.

Не слід застосовувати при порушеннях функції щитовидної залози без консультації з лікарем.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При тривалих проявах симптомів чи погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Невідома.

Діти. Препарат не застосовують дітям.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим – по 10 крапель 3 рази на добу за

15-20 хвилин до або через 1 годину після їди. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу капати під язик). При нападі болю у нижніх кінцівках, який супроводжується кульгавістю, разову дозу рекомендується приймати кожні 15 хвилин до покращення стану, але не більше ніж

2 години. Далі перейти на прийом 3 рази на добу.

Курс лікування – 4-6 тижнів. При необхідності через 2-3 тижні курс лікування повторюють (після консультації з лікарем).

Передозування. Можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні ефекти.

У поодиноких випадках можуть виникати побічні реакції з боку травного тракту або шкірні реакції, у тому числі через кілька днів після застосування.

У дуже рідкісних випадках в осіб із гіперчутливістю до рослин родини складноцвітих (наприклад, *Arnica*, *Echinacea*) чи до інших компонентів препарату можуть спостерігатися алергічні реакції.

Після застосування препаратів, що містять екстракти *Echinacea*, спостерігалися побічні реакції з боку травного тракту (нудота, біль у животі); менструальні розлади; акне, висипання на шкірі, почервоніння, свербіж, кропив'янка; збудження, порушення сну, у поодиноких випадках – набряк обличчя, утруднене дихання (задишка), запаморочення та зниження артеріального тиску.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Внаслідок імуностимулюючої дії ехінацея може зменшувати ефективність препаратів, що чинять імунодепресивну дію.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 30 мл у скляному флаконі-крапельниці у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.