

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ВЕРТИГОХЕЕЛЬ
(VERTIGONEEL)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 г препарату містять: Ambra grisea D6 – 10 г, Anamirta cocculus D4 – 70 г, Conium maculatum D3 – 10 г, Petroleum rectificatum D8 – 10 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.

1 мл препарату містить 2 1 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Прозорий, безбарвний розчин із запахом етанолу.

Назва і місцезнаходження виробника.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат нормалізує стан мозкового кровообігу, має психотонізуючу, метаболічну (на центральну нервову систему), судинорозширювальну дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

Показання для застосування.

Запаморочення нейрогенного, судинного та травматичного походження, особливо при інсульті, струсі головного мозку, дисциркуляторній енцефалопатії, артеріальній гіпертензії, атеросклерозі судин головного мозку, хворобі Мен'єра; при запамороченнях, що виникають при подорожуванні (літаком, кораблем, автомобілем).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Якщо симптоми зберігаються чи погіршується стан, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар індивідуально.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат містить етанол, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти. Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 1 року.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дітям від 6 років – по 10 крапель, дітям від 1 до 3 років – по 3 краплі, від 3 до 6 років – по 5 крапель. Застосовують 3-4 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через годину після їди. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого лікар може змінювати тривалість курсу лікування та частоту прийому (до 1-2 разів на добу).

При нападі запаморочення та нудоти приймати разову вікову дозу кожні 15 хвилин до покращання стану, але не більше 2 годин. Далі приймати 3 рази на добу.

Курс лікування при хронічному стані триває 2-4 тижні. При необхідності через 1-2 тижні курс лікування повторюють.

Передозування.

Не відзначалося.

Побічні ефекти.

У осіб з індивідуальною непереносимістю можливі реакції гіперчутливості.

Застосування гомеопатичних лікарських препаратів може викликати тимчасове погіршення стану (початкове загострення).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома. За призначенням лікаря препарат можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

Категорія відпуску. Без рецепта.