

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ІМПАЗА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 таблетка містить агітіла до ендотеліальної NO синтазиафінно очищені: суміш гомеопатичних розведень C12, C30 та C200 – 3 мг;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки.

Таблетки плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою, від білого до майже білого кольору. На одному плоскому боці з рискою нанесено напис MATERIA MEDICA, на іншому плоскому боці нанесено напис ІМПАЗА.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «НВФ «Матеріа Медика Холдинг».
Російська Федерація, 127473, м. Москва, 3-й Самотечний пров., буд. 9, тел./факс: +7 (495) 684-43-33.

Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний препарат.

Препарат підвищує активність ендотеліальної NO синтази, відновлює продукування ендотелієм оксиду азоту (NO) при сексуальній стимуляції, підвищує вміст у гладких м'язах циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ) та сприяє їх розслабленню, що призводить до підвищення кровонаповнення печеристих тіл, та забезпечує достатню за силою та тривалістю ерекцію.

Препарат підвищує лібідо (статевий потяг) та задоволення статевим актом.

Регулярний прийом препарату сприяє підвищенню вмісту тестостерону у сироватці крові (при помірно зниженому вихідному рівні).

Показання для застосування.

Порушення ерекції (еректильна дисфункція) різного походження.

Вегетативні розлади клімактеричного періоду у чоловіків (слабкість, стомлюваність, зниження фізичної активності, зниження лібідо).

Противпоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

До складу препарату входить лактоза, тому пацієнтам із вродженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози та вродженою лактазною недостатністю не можна застосовувати препарат.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосовується дорослими чоловіками.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат не чинить седативної дії, тому не впливає на швидкість реакції.

Діти.

Препарат не застосовують дітям.

Спосіб застосування та дози.

Препарат приймають внутрішньо. Не застосовувати препарат разом з їжею. Застосовувати по

1 таблетці на прийом. Таблетку тримати у роті (бажано не розжовувати та не ковтати) до повного розчинення.

Варіанти застосування:

1. Регулярний прийом. Для стабілізації статевої потенції (здатності до статевого акту) рекомендований лікувально-профілактичний курс тривалістю не менше 12 тижнів. В залежності від вираженості еректильної дисфункції частота прийому може варіювати: від 1 таблетки через день до двох прийомів по 1 таблетці щоденно, бажано у вечірній час.

У разі необхідності курсову терапію можна повторити через 3-6 місяців.

2. Періодичний прийом. Для епізодичного стимулювання ерекції препарат приймати перед статевим актом по 2 таблетки за 1-2 години до очікуваної близькості.

Передозування.

При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, спричинені компонентами, що входять до складу препарату.

Побічні ефекти.

При використанні препарату за вищезазначеними показаннями та у зазначених дозах побічної дії не виявлено.

Можливі реакції підвищеної індивідуальної чутливості до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Випадки несумісності з іншими лікарськими засобами не зареєстровані. Можливе використання препарату на фоні прийому органічних нітратів хворим з ішемічною хворобою серця (стенокардією напруження I-II функціонального класу), та застосування сумісно з бета-адреноблокаторами, діуретичними засобами, інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ), антагоністами кальцію.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C, в оригінальній упаковці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.