

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**КРАПЛІ ЗЕЛЕНІНА**  
**(GUTTAE ZELENINI)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 1 мл препарату містить настойки беладоны листя *Belladonnaefolia* (1:10) (екстрагент – етанол 40 %) 0,2 мл, настойки конвалії трави (*Convallariae herba*) (1:10) (екстрагент – етанол 70 %) 0,4 мл, настойки валеріани кореневищ з коренями (*Valerianaerhisoma cum radicibus*) (1:5) (екстрагент – етанол 70 %) 0,4 мл, ментолу рацемічного 8 мг;

**Лікарська форма.** Краплі оральні.

Прозора рідина зеленуватого або жовто-бурого кольору з характерним запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».  
Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.

**Фармакотерапевтична група** Комбіновані кардіологічні препарати. Код АТХ С01ЕХ.

Препарат чинить седативну, спазмолітичну, кардіотонічну, анагетичну дію, зумовлені біологічно активними речовинами, які входять до складу препарату. Завдяки вмісту настойки беладоны прискорює серцевий ритм.

**Показання для застосування.**

Вегетативні неврози, брадикардія.

**Протипоказання.**

Гіперчутливість до компонентів препарату. Органічні ураження серця і судин, глаукома, гіпертрофія передміхурової залози.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Пацієнтам літнього віку та дітям віком від 12 років препарат застосовувати з обережністю через вміст беладоны настойки (алкалоїд групи атропіну).

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Протипоказано.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* У період лікування препаратом слід утримуватися від керування автотранспортом та роботи з іншими механізмами.

*Діти.* Не застосовувати дітям до 12 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Внутрішньо дорослим застосовувати по 20-25 крапель 2-3 рази на добу, розводячи невеликою кількістю води. Дітям старше 12 років – з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 2-3 рази на добу. Тривалість курсу лікування визначає лікар.

**Передозування.**

Може з'явитися серцебиття, сухість у роті, порушення акомодатції, розширення зіниць, головний біль, запаморочення, загальна слабкість, нудота, тахікардія. При виявленні ознак передозування необхідно припинити застосування препарату і звернутися до лікаря з метою проведення симптоматичної терапії.

**Побічні ефекти.**

*Неврологічні розлади:* психомоторне збудження, сонливість, депресія, зниження розумової та фізичної працездатності, пригнічення емоцій, головний біль, запаморочення, розлади зору.

*Кардіальні порушення:* тахікардія.

*Шлунково-кишкової розлади:* сухість у роті, спрага, нудота, блювання, діарея, запор.

*Порушення з боку опорно-рухової системи та сполучної тканини:* м'язова слабкість.

*Алергічні реакції,* включаючи почервоніння шкіри, висипання, свербіж, набряки.

*Загальні порушення:* підвищення температури тіла.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Препарат посилює вплив седативних, снодійних засобів, нейролептиків, транквілізаторів на центральну нервову систему, кардіотоніків, анагезуючих засобів. Зменшує дію антиаритмічних засобів, які призначають при тахікардії.

**Термін придатності.** 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 25 мл у флаконі.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.