

# ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

КАНДИД

(CANDID)

Склад лікарського засобу:

*діюча речовина:* clotrimazol;

1 мл розчину містить клотримазолу 10 мг;

*допоміжні речовини:* пропіленгліколь, гліцерин.

**Лікарська форма.** Розчин для ротової порожнини.

Прозора в'язка рідина без кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

Гленмарк Фармасьютікалз Лтд.

Plot No. E-37/39, M.I.D.C., Industrial Estate, Satpur, Nasik - 422 007, Maharashtra, India /

Дільниця № E-37/39, Ем. Ай. Ді. Сі., Сатпур, Насік - 422 007, Махараштра, Індія.

Фармакотерапевтична група.

Засоби для застосування у стоматології. Протимікробні та антисептичні засоби для місцевого застосування.

Код АТС А01АВ18.

Фармакологічна дія Кандіду обумовлена властивостями клотримазолу, що входить до його складу. Клотримазол – протигрибковий засіб широкого спектра дії з групи похідних імідазолу. До клотримазолу чутливі дерматофіти, дріжджові гриби, а також плісняві гриби.

Ефект клотримазолу пов'язаний з порушенням синтезу ергостерину, що входить до складу клітинної мембрани грибів, у результаті чого змінюються структура та властивості мембран, спостерігається лізис клітин.

При місцевому застосуванні лише незначні кількості клотримазолу всмоктуються у кров, тому системні ефекти відсутні.

Показання для застосування.

Місцеве лікування кандидозу ротової порожнини. Фарингомікози.

### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до будь-якої зі складових препарату.

### **Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Препарат не призначений для прийому внутрішньо, тому не рекомендується ковтати його при застосуванні.

### **Особливі застереження.**

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату у період вагітності можливе тільки у разі, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Дані щодо можливості проникнення клотримазолу у грудне молоко відсутні. Тому препарат можна застосовувати у період годування груддю тільки тоді, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Немає достатніх даних щодо застосування препарату дітям.

### **Спосіб застосування та дози.**

10-20 крапель Кандіду наносять на уражені ділянки слизової оболонки рота за допомогою ватного тампона 3-4 рази на день. Усі уражені ділянки слизової оболонки рота повинні бути оброблені препаратом. Зазвичай позитивний результат від застосування спостерігається на 3-5-й день лікування, однак в окремих випадках лікування може бути продовжене доти, поки ознаки інфекції не зникнуть повністю. Під час і після лікування особливо увагу необхідно приділити усуненню будь-яких впливів, які можуть призвести до повернення інфекції.

Курс лікування визначає лікар.

### **Передозування.**

При рекомендованому режимі застосування виникнення симптомів передозування неможливе.

### **Побічні ефекти.**

Можливі алергічні реакції. Біль та подразнення на місці аплікації.

Можуть виникнути непритомність, артеріальна гіпотензія, задишка, висипи на шкірі, кропив'янка, еритема, печіння, поколювання, свербіж, набряк, контактний дерматит.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дані відсутні.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 15 мл препарату у флаконах із пробкою-крапельницею та ковпачком, по 1 флакону у картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.