

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

ДОКТОР МОМ®

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г мазі містить ментолу (левоментолу) 30,5 мг, камфори 52,5 мг, тимолу 1 мг, олії скипидарної 0,056 мл, олії евкалиптової 0,015 мл, олії мускатної 0,005 мл;

допоміжні речовини: парафін білий м'який.

Лікарська форма. Мазь.

Напівпрозора мазь від білого до майже білого кольору з характерним запахом ментолу та камфори.

Назва і місцезнаходження виробника.

«Юнік Фармасьютікал Лабораторіз» (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютікалз Лтд.»).

Unique Pharmaceutical Laboratories (a division of J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.).

Ділянка № 304-308, Джі. Ай. Ді. Сі. Індастріал Еріа, місто Панолі – 394 116, округ Бхарух, Індія.

Plot No. 304- 308, G.I.D.C. Industrial Area, City: Panoli – 394 116, Dist: Bharuch, India.

Фармакотерапевтична група. Комбіновані препарати для застосування при кашлі та застудних захворюваннях.

Код АТС R05X.

При зовнішньому застосуванні препарат чинить подразнювальну, відволікаючу, протизапальну та антисептичну дію.

Фармакологічні властивості обумовлені компонентами, які входять до його складу:

ментол – розширює кровоносні судини, викликає відчуття холоду, що супроводжується знеболювальним ефектом;

камфора – спричиняє подразнювальну та знеболювальну дію;

тимол – антисептичний засіб з протибактеріальною та протигрибковою діями;

олії скипидарна та евкалиптова – чинять подразнювальну дію при місцевому нанесенні;

олія мускатна – пригнічує синтез простагландинів.

Препарат не чинить системної дії.

Показання для застосування.

У складі комплексної терапії гострих респіраторних захворювань, які супроводжуються нежитьом, відчуттям закладеності носа, кашлем.

Симптоматична терапія м'язового болю, болю у спині, головного болю.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату; бронхіальна астма, коклюш, псевдокруп, схильність до судомдитячий вік до 3 років; порушення цілісності шкіри, у тому числі при опіках, екземі, дерматиті, гнійничкових захворюваннях шкіри.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Тільки для зовнішнього застосування!

Не втирати у ніздрі, уникати потрапляння в очі, на слизову оболонку носа та ротової порожнини (при потрапленні слід промити великою кількістю води). Не наносити на uszkodжені ділянки шкіри!

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Через відсутність досвіду застосування препарату ДОКТОР МОМ® мазь у період вагітності або годування груддю призначати препарат цієї категорії пацієнтів не рекомендується.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. У разі виникнення побічних реакцій з боку нервової системи (запаморочення, збудження, судоми) слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами

Діти. Ефективність і безпека застосування препарату дітям віком до 3 років досліджені недостатньо. Дітям віком від 3 років застосовувати з обережністю, за рекомендацією та під наглядом лікаря.

Спосіб застосування та дози. Дорослим та дітям віком від 3 років ДОКТОР МОМ® мазь призначати 2 або 3 рази на добу.

При нежиті або закладеності носа невелику кількість мазі з обережністю, не втираючи, наносити на шкіру крилець носа; при кашлі, пов'язаному із застудою, мазь наносити тонким шаром на шкіру грудної клітки (у ділянці грудини) і злегка втирати;

при головному болю мазь наносити на шкіру скроневих ділянок;

при болю у м'язах, спині мазь наносити на ділянки, що болять, злегка втирати і прикривати ці ділянки теплою пов'язкою.

Передозування. Можливе посилення побічних реакцій, відчуття сильного тепла та печіння. При випадковому потрапленні внутрішньо можливі біль у животі, нудота, блювання, діарея, симптоми пригнічення центральної нервової системи, запаморочення, атаксія, судоми, припливи, сонливість, утруднення дихання.

Лікування: змити нанесений препарат водою з милом, промивання шлунка, симптоматична терапія.

Побічні реакції. Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, кропив'янку, свербіж, подразнення шкіри та слизових оболонок, почервоніння, дерматит, включаючи контактний дерматит, особливо у дітей.

З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, збудження, можливе виникнення судом, спричинених камфорою.

З боку дихальної системи: при застосуванні препарату можливе збільшення імовірності та частоти виникнення спазму бронхів, особливо у дітей.

При появі таких реакцій лікування негайно слід припинити.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Взаємодія з іншими лікарськими засобами при місцевому застосуванні препарату мінімальна. Не рекомендується застосовувати одночасно з іншими мазями та кремами.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Після застосування слід щільно закрити баночку кришкою.

Упаковка. По 20 г у пластиковій баночці. По 1 баночці у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.